Inserm

Institut national
de la santé et de la recherche médicale

Hôpitaux de Lyon

Hypersensibilité Immédiate

Pr Frédéric Bérard

Service d'Immunologie Clinique et Allergologie

UFR de Médecine Lyon Sud – Charles Merieux

28 Janvier 2010

Allergie = Hypersensibilität

I

II

III

IV

HSI
(Hypersensibilité de type I)
= Anaphylaxie
= IgE

HSI

- **Description du premier cas en 1765 (Desbrest)**
- **Manifestations très rapides (qq minutes) après le contact avec l'antigène (allergène)**
- **Il y a parfois des manifestations d'HSI au cours de l'atopie, mais il existe aussi des réactions de type HSI chez les non atopiques**

Mécanismes (1)

- **Expérience du chien de Richet et Portier (1902)**
- **Réaction de Prausnitz-Küstner (Anaphylaxie Passive, 1921)**
- **Expériences de transfert de sérum d'un animal sensibilisé :**
 - **IV puis Ag local (Prausnitz) : 2 phases histologiques (vasodilatation précoce, recrutement cell. 6-24H)**
 - **Intra dermique puis (Ag + bleu Evans) IV à 24h : (coloration bleu locale)**

Mécanismes (2)

- **Homme : IgE +++ (certains IgG3 et IgG1)**
- **Taux : 50 à 100 UI/ml**
- **$\frac{1}{2}$ vie : serum 2-3J / x mois sur cellules**
- **Récepteurs de forte affinité à la surface des mastocytes et des polynucléaires basophiles +++**
- **Egalement sur Langerhans, eosinophiles, macrophages, ...**
- **N'activent pas le complément**

Le mastocyte

- Précurseur CD34
- c-kit (protooncogène)
(ligand = facteur de croissance des masto)
- molécules du CMH de classe I et II, molécules de co-stimulation

Mastocytes / Histamine

ACTIVATION MASTOCYTAIRE

Voie d'activation du Mastocyte:

1- Libération de médiateurs préformés : Histamine +++

- **H1 : broncho[C], vasodilatation**
- **H2 : feed back (-), sécrétion gastrique**
- **H3 : SNC (somnolence)**

- **Aussi : libération de TNFalpha préformé, de facteur chimiotactique des PNE (ECF-A), sérotonine, héparine, d'enzymes protéolytiques activant le complément**

2- Médiateurs néoformés : phospholipides membranaires

C. Réaction anaphylactoïde

3- Synthèse tardive

- **Cytokines et chimiokines**
 - **IL-1, 3, 4, 5, 6, 10, TNF-alpha, GM-CSF**
- **CD40-L (activation des B et des APC)**
- **Permettent - entre autres - le recrutement tardif (6 à 24H) de cellules inflammatoires au sein du foyer**

- **NB : AC anti-IL-5 ne bloque pas la phase aigue de l'asthme chez la souris, mais bloque la phase tardive avec abolition de l'aflux de PNE dans le poumon**

Déroulement de la réaction :
De la synthèse des IgE à l'expression
clinique

Patient allergique : LTH2 (IL-4 / IgE, IL-3 et 5 / PNE)
Patient non allergique : LTH1 (IFN γ antagonise IL-4)

Phase tardive de l'HSI:

Eosinophiles :

Recrutement :

- ECF-A, Leucotriènes
- Cytokines, (IL5, IL3, eotaxine, GM-CSF...)

Activés / IgE (dégranulation)

Neutrophiles :

- Recrutement par LTB4 et IL-8

Macrophages

Plaquettes

Lymphocytes T et B (Σ IgE)

Les allergènes

ALLERGENES

ALLERGENES SAISONNIERS

Calendrier pollinique

Allergies perennuelles

Acarien

- Taille : 250-450 µm
- Aliment : Squames d'humains et d'animaux, moisissures

Signification en allergologie : +++

Acarien de stockage

- Taille : 750-550 µm
- Aliment : Céréales et autres aliments

Signification en allergologie : +

A. Acarien

Types d'Aspergillus

- Survenue : aliments, climatisation, habitations humides

Signification en allergologie : ++

Espèces de Penicillium

- Survenue : dans la terre, sur les plantes, poussières domestiques, poussière flottante

Signification en allergologie : ++

B. Moisissures

Chat

- Allergie la plus importante aux mammifères
- Allergies croisées marquées

Signification en allergologie : ++

Chien

- fréquentes allergies selon la race
- allergies croisées rares

Signification en allergologie : (+)

Oiseaux

- importante, perruches, perroquets, pigeons

Signification en allergologie : +

C. Allergènes animaux

Clinique

Les 4 grades de l'anaphylaxie

- **Grade I : signes cutanés (urticaire)**
- **Grade II : signes extra cutanés**
- **Grade III : signes sévères**
- **Grade IV : arrêt cardio respiratoire**

Urticaire

Réaction inflammatoire cutanée :

- **Vasodilatation, Oedeme et Prurit +++**
- **Aiguë / chronique**

Œdème du derme / Vaisseaux

Angio- Oedeme (Quincke)

**Choc
anaphylactique**

Allergie aux venins d'hyménoptères

Les Tests Diagnostiques (Interrogatoire, sérologies, provocation)

TESTS ALLERGOLOGIQUES

1

Allergènes pour tests à concentrations connues

Allergie – Hypersensibilité aux antigènes de l'environnement

Tests cutanés aux pneumallergènes chez un patient atopique

Autres Tests

- **Immunobiologie**
(cf cours Dr F. Bienvenu)

Traitement

- **Eviction de l'allergène +++**
- **REACTION PRECOCE / ANTI
HISTAMINIQUES**
- **REACTION TARDIVE /
CORTICOIDES**

Principales molécules

- **Anti-histaminiques de 1ere génération : sédatifs et anti-chol (CI / prostate, glaucome)**
- **2° génération : anti H1 plus spécifiques**
- **anti H2 peuvent être associés dans formes rebelles**
- **Inhib. entrée calcique : Nalcron (cromoglycate disodique)**
- **Anti LKT**

Prise en charge de l'anaphylaxie au delà de l'urticaire

- **Grade II : signes extra cutanés**
- **Grade III : signes sévères**
- **Grade IV : arrêt cardio respiratoire**

- **Dans les 3 cas, adrénaline IV (0,01 mg, 0,1 mg, 1 mg) +/- remplissage**

L'ATOPIE

**« tendance génétique à développer
des réponses Th2 contre des
protéines de l'environnement »
(donc facilité à élaborer une
réponse IgE)**

**« EPIDEMIE » DE MALADIES ATOPIQUES
(Atopie : Coke et Coca 1921)**

4 grandes manifestations cliniques

Fig. 2-2 Variation de la fréquence des symptômes allergiques courants en fonction l'âge. (D'après [1].)

Atopie

XIX^e siècle 1960 2010

exceptionnel 5% 20%

Génétique

- Fréquence selon ascendants
- Variations cytokines (récept, taux,...)
-

Environnement

Allergènes et signaux de danger

Etiologies de l'atopie

Maladies allergiques

Facteurs environnementaux

- Diminution des infections
 - Vaccination, antibiotiques, aliments, extrême propreté
- Aliments:
 - Diversification trop précoce, habitudes alimentaires nouvelles
- Fragilisation des épithéliums de revêtement
 - Lavages trop fréquents, antiseptiques, pollution industrielle
- Habitat urbain
 - Chauffage, tapis, moquettes, confinement
- Stress de la vie moderne
- Monde rural
 - Terrains non cultivés

**La dermatite atopique:
notions relatives aux IgE
(pour le reste, cours du Pr JF Nicolas)**

Dermatite atopique : 2 entités ?

- **Extrinsèque (2/3) :**
 - **IgE élevées**
 - **Allergènes (protéines) de l'environnement**
 - **Tests cutanés (+)**

Dermatite atopique : 2 entités ?

- **Extrinsèque (2/3) :**
 - **IgE élevées**
 - **Allergènes (protéines) de l'environnement**
 - **Tests cutanés (+)**

- **Intrinsèque (1/3) :**
 - **IgE normales**
 - **Maladie auto-immune**
 - **Tests cutanés (-)**

•MAIS :

–IgE anti auto-antigènes épidermiques dans certains cas étiquetés « allergiques » (Hom s 1-5, DSF 70)

–Les 2 formes :

– Atteinte cutanée ie à l'interface entre SI et environnement

–Xérose cutanée +++

DA = Rupture de tolérance aux protéines par HSR

**Atopy Patch Tests
(DA extrinsèque)**

	Type I	Type II	Type III	Type IV		
Facteur immunitaire en cause	IgE	IgG	IgG	Cellules T _H 1	Cellules T _H 2	CTL
Antigène	Antigène soluble	Antigène associé à la cellule ou à la matrice	Antigène soluble	Antigène soluble	Antigène soluble	Antigène cellulaire
Mécanisme effecteur	Activation des mastocytes	Cellules FcR ⁺ (phagocytes, cellules NK)	Cellules FcR ⁺ Complément	Activation des macrophages	Activation des éosinophiles	Cytotoxicité

Exemple de réaction d'hypersensibilité	Rhinite allergique, asthme, anaphylaxie systémique	Allergie à certains médicaments (e.g. pénicilline)	Maladie sérique, réaction d'Arthus	Dermatite de contact, réaction tuberculique	Asthme chronique, rhinite allergique chronique	Dermatite de contact

Modifié d'après Janeway et col. 2^o édition Française 2003

Maladies allergiques - Perspectives

- **Maladies récentes**
 - liées au mode de vie urbain
- **Traitements actuels:**
 - Éviction
 - Symptomatique
- **Traitements futurs:**
 - Induction de tolérance spécifique
- **Prévention:**
 - Education, information
 - Formation des soignants
 - Prise en charge du stress