



Que faire avant d'initier l'ustékinumab ?

Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Cette check-list a pour objectif de vous aider à chercher systématiquement les principales contre-indications ou précautions d'emploi de l'ustékinumab. Elle ne comprend pas le bilan d'activité ni de sévérité de la maladie justifiant ce traitement.

- **À l'interrogatoire**, vérifier l'absence de :
 - ✓ Antécédent personnel, ou familial, ou contact avec un cas de tuberculose
 - ✓ Antécédent d'infections sévères, chroniques et/ou récidivantes (bactériennes, virales) et de facteurs de risque (cathéter, implant)
 - ✓ Antécédent de cancer solide et d'affections hématologiques
 - ✓ Antécédent de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
 - ✓ Désir de grossesse ou de paternité.
- **À l'examen clinique**, vérifier l'absence de :
 - ✓ Fièvre
 - ✓ Infection évolutive
 - ✓ Adénopathies ou un autre signe clinique lié
 - ✓ Signes orientant vers une néoplasie.
- **Les vaccinations :**
 - ✓ On proposera une mise à jour des vaccinations si possible au moins 2 semaines avant le début du traitement
 - ✓ On recommandera une vaccination contre le pneumocoque, idéalement par une injection de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (Prevenar13®) suivie d'une injection au moins 2 mois après une injection de vaccin polysaccharidique 23-valent (Pneumo23®), et contre la grippe.
- **Les examens complémentaires à demander systématiquement en 1^{ère} intention :**
 - ✓ Hémogramme
 - ✓ Biologies hépatique et rénale
 - ✓ Électrophorèse des protéines sériques
 - ✓ Radiographie du thorax
 - ✓ Test *in vitro* Quantiféron Gold® ou T-Spot-TB® ou Intradermoréaction à la tuberculine 5 UI (Tubertest®)
 - Si lors d'un précédent dépistage, un traitement antituberculeux préventif a été prescrit le dépistage ne sera pas renouvelé
 - Si un précédent dépistage de plus de deux ans était négatif, il est conseillé de le refaire
 - Si le dépistage n'a jamais été fait, il est recommandé de suivre les recommandations de l'ANSM, anciennement AFSSAPS, pour le dépistage des tuberculoses latentes.

- ✓ Sérologies hépatites B et C, et avec accord du patient, sérologie VIH. Si des sérologies de moins de 5 ans sont disponibles, elles ne seront pas refaites sauf en cas de facteurs de risque ou de geste médical à risque dans l'intervalle
- ✓ Application des règles de bonnes pratiques de dépistage des facteurs de risque de néoplasie
 - Dépistage du cancer colorectal : Recommandations HAS 2013 sur www.has-sante.fr
 - Dépistage individuel du cancer de la prostate : Recommandations HAS 2013 sur www.has-sante.fr
 - Dépistage du cancer du sein : Recommandations HAS 2014 sur www.has-sante.fr.

● **Les contre-indications de l'ustékinumab :**

- ✓ Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients
- ✓ Infection active et cliniquement importante (par exemple une tuberculose active).

● **Les précautions d'emploi :**

- ✓ Infection chronique ou antécédents d'infections récurrentes
- ✓ Dépistage tuberculose latente
- ✓ Tumeurs malignes solides
- ✓ Hypersensibilité au latex. Le conditionnement de l'ustékinumab contient du latex (présent uniquement dans les seringues) qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques graves chez les personnes sensibles.