



## Que faire avant d'initier le sécukinumab ?

Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Cette check-list a pour objectif de vous aider à chercher systématiquement les principales contre-indications du sécukinumab. Elle ne comprend pas le bilan d'activité ni de sévérité de la maladie justifiant ce traitement.

### ● À l'interrogatoire, vérifier l'absence de :

- Antécédent personnel ou familial de tuberculose, ou contact avec un cas de tuberculose
- Antécédent d'infections sévères, chroniques et/ou récidivantes (bactériennes, virales, mycosiques), en particulier à *Candida*
- Antécédent de néoplasie ou de maladie lymphoproliférative
- Antécédent de Maladie Inflammatoire Chronique de l'Intestin (MICI)
- Désir de grossesse
- Risque cardiovasculaire élevé et facteurs de risque cardiovasculaire mal contrôlés

### ● À l'examen clinique, vérifier l'absence de :

- Fièvre
- Infection évolutive
- Adénopathies
- Signes orientant vers une néoplasie
- Signes orientant vers une MICI. En cas de symptômes évocateurs (douleurs abdominales, diarrhée, perte de poids, anorexie, sang/glaïres dans les selles, atteinte de la région anale [fissure, abcès]...), le patient sera adressé au gastroentérologue pour réaliser les explorations digestives nécessaires.

### ● Les vaccinations

- On proposera une mise à jour des vaccinations avec vaccins inactivés si possible au moins 2 semaines avant le début du traitement
- On recommandera une vaccination contre le pneumocoque et contre la grippe

### ● Les examens complémentaires à demander systématiquement en 1<sup>ère</sup> intention

- Hémogramme
- Électrophorèse des protéines sériques
- Radiographie du thorax
- Test *in vitro* Quantiféron Gold® ou T-Spot-TB® ou Intradermoréaction à la tuberculine 5 UI (Tubertest®)
  - Si lors d'un précédent dépistage, un traitement antituberculeux préventif a été prescrit, le dépistage ne sera pas renouvelé.
  - Si un précédent dépistage de plus de 2 ans était négatif, il est conseillé de le refaire.
  - Si le dépistage n'a jamais été fait, il est recommandé de suivre les recommandations de l'ANSM, anciennement AFSSAPS, pour le dépistage des tuberculoses latentes.
- Sérologies hépatites B et C et avec accord du patient sérologie VIH  
Si des sérologies de moins de 5 ans sont disponibles, elles ne seront pas refaites

sauf en cas de facteurs de risque ou de geste médical à risque dans l'intervalle.

- Application des règles de bonnes pratiques de dépistage des facteurs de risque de néoplasie
  - Dépistage du cancer colorectal : Recommandations HAS 2013 sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)
  - Dépistage individuel du cancer de la prostate : Recommandations HAS 2013 sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)
  - Dépistage du cancer du sein : Recommandations HAS 2015 sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)
  - Dépistage du cancer de l'utérus : Recommandations HAS 2013 sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)
  
- **Les contre-indications du sécukinumab**
  - Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients
  - Infection active et cliniquement importante (par exemple une tuberculose active)
  
- **Les précautions d'emploi**
  - Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI)
  - Infection chronique ou antécédents d'infections récurrentes
  - Réactions d'hypersensibilité
  - Vaccins vivants