Physiopathologie des Hypersensibilités

**Effets indésirables immunologiques
des médicaments: aspects cliniques**

The collage features several logos and group photographs. At the top left is the logo for 'Lyon 1' (Université Claude-Bernard de Lyon). To its right is the department name 'Département Allergologie et Immunologie Clinique'. Further right is the 'Inserm' logo, with the text 'Instituts thématiques' and 'Institut national de la santé et de la recherche médicale' below it. Below these are three group photos: a group of people in white lab coats, a group of people in a hallway, and a large group of people outdoors. A blue diamond-shaped logo for 'LYREC' is positioned over the first group photo. A white box with the text 'Clinical Research Unit' is placed below the first group photo. A white box with the text 'INSERM translational research team' is placed below the second group photo. A vertical white box with the text 'Allergy & Clinical Immunology Department' is on the left side of the large outdoor group photo. On the right side, there is a purple circular logo for 'ciri' and a blue square logo for 'Méditerranée 2017'.

Hypersensibilités
Classification de Gell & Coombs

	Antibody			T cells			
	Type I	Type II	Type III	Type IVa	Type IVb	Type IVc	Type IVd
Immune reactant	IgE	IgG	IgG	IFN- γ , TNF- α Th1/Type 1	IL-5, IL-4/IL-13 Th2/Type 2	Perforin/ granzyme B Cytotoxic	CXCL8, Th17/Type 17
Antigen	Soluble antigen	Cell- or matrix-associated antigen	Soluble antigen	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Cell-associated antigen or direct T-cell stimulation	Soluble antigen presented by cells or direct T-cell stimulation
Effector	Mast cell activation	FcR+ cells (phagocytes, NK cells)	FcR+ cells Complement	Macrophage activation	Eosinophils	T cells	Neutrophils
				Chemokines, cytokines, cytotoxic	Cytokines, inflammatory mediators		Cytokines, inflammatory mediators
Maladies autoimmunes et allergiques	Anaphylaxie Rhinite allergique Asthme (écro)	Réaction transf. Anémie hémol. Thyroïdie Myasthénie	Maladie sérique Lupus érythémateux	IDR tuberculine Rejet de greffe Polyarthrite Diabète	Asthme chron. Rhinite chron.	Rejet de greffe Diabète SEP	Polyarthrite Sclérose en plaque Mal. de Crohn
Dermatoses autoimmunes et allergiques	Urticaire contact	Pemphigus Pemphigoïde Urticaire chron.	Vascularites	Psoriasis	Dermatite atopique	Vitiligo Pelade Eczéma contact	Psoriasis
Allergies médicaments	Choc anaphylactique	Cytopénies medic.	Vascularites immuno-allerg.	Exanthème medic.	DRESS	Lyell Stevens-Johnson

Hypersensibilité aux médicaments

Audrey NOSBAUM, Florence HACARD, Benoit BENSAID,
Aurore ROZIERES, Marc VOCANSON,
Frédéric BERARD, Jean-François NICOLAS

Université Lyon1, CHU Lyon-Sud, Inserm U1111-CIRI

Hypersensibilité (allergique et non allergique) aux médicaments

1- Allergie

2- Pseudo-allergie, fausse allergie et
intolérance aux médicaments

Audrey NOSBAUM, Florence HACARD, Benoit BENSAID,
Aurore ROZIERES, Marc VOCANSON,
Frédéric BERARD, Jean-François NICOLAS

Université Lyon1, CHU Lyon-Sud, Inserm U1111-CIRI

DOSSIER

HYPERSENSIBILITÉ AUX MÉDICAMENTS

DOSSIER ÉLABORÉ AVEC LES CONTRIBUTIONS DE
Dr JEAN-FRANÇOIS NICOLAS
Service allergologie et immunologie clinique, CHU Lyon-Sud, Hôpital territorial Lyon-Sud, Lyon, France.
jean.franc.nicolas@chu-lyon.fr

Les médicaments peuvent induire différents types de réactions immunologiques qui, avec les hypersensibilités non allergiques, représentent 15 % de l'ensemble des effets indésirables des médicaments. L'hypersensibilité non allergique, la plus fréquente, ressemble à de l'allergie sans mécanisme immunologique prouvé.¹ Les réactions d'hypersensibilité aux médicaments affectent 7 % de la population générale et sont un problème sérieux pour les patients et leurs médecins en termes de diagnostic et de prise en charge ultérieure. Elles peuvent aussi être une cause de retrait de ces médicaments (par exemple bufexamac, glafépine, propacétamol, tétrazépam). Si les éruptions urticariennes et les exanthèmes sont les principales manifestations, il existe beaucoup d'autres présentations cliniques de hypersensibilité aux médicaments. >>>

SUMMARY
 • P. 988 Définitions et mécanismes • P. 972 Urticaire et angio-œdème induits • P. 976 Anaphylaxie systémique et choc anaphylactique • P. 981 Exanthèmes et toxicodermes sévères • P. 986 Induction de tolérance aux médicaments

La Revue du Praticien
Vol 65, sept 2015,
Pp 967-989.

la-revue-du-praticien Vol 65 - Septembre 2015 967

Applications x Intranet HCL x Journée Urticair Chroniq x Cours Immun

allergo.lyon.inserm.fr/Hypersensibilite_%20medicaments.htm

AllergoLyon.fr

Informations patients

- Actualités
- Service d'Immunologie Clinique et Allergologie Lyon Sud
- Colloques du Service et DESC Allergologie et Immunologie Clinique 2015-2016 et 2016-2017
- Recherche Clinique : Unité de Recherche Clinique en Immunologie Lyon Sud (URCI - LS)
- Equipe de recherche Inserm U1111 - CIRI
- Allergobiotec
- Enseignement Allergologie - Immunologie
- Maladies allergiques
- Hypersensibilité aux médicaments**
- Dermatite atopique
- Eczéma de Contact
- Urticair Chronique
- Psoriasis
- Education thérapeutique
- Plan d'accès au Service d'Immunologie Clinique et Allergologie. Plan du Groupement Hospitalier Sud.
- Plan d'accès au Groupement Hospitalier Sud.

Hypersensibilité aux médicaments

L'hypersensibilité (HS) aux médicaments est fréquente mais exceptionnellement sévère et elle n'est allergique que dans 5% des cas. Le bilan allergologique réalisé à l'hôpital permettra de tester les médicaments en cause, d'établir la réalité d'une allergie ou non et de permettre dans tous les cas la prise de médicaments lorsque ceux-ci sont indispensables à la santé du patient. Ci-dessous, une fiche pratique à remettre aux patients après explications et le dossier que nous avons réalisé en 2015 pour la Revue du Praticien.

Dossier Revue du Praticien 2015 (en format .pdf)

Fiche Hypersensibilité aux médicaments (en format .pdf)

Responsable publication : Jean-François Nicolas Webmaster
6 octobre 2015

HS aux médicaments - Plan

- Introduction
- Hypersensibilité allergique et non allergique
 - Immunité innée et adaptative
 - Physiopathologie
 - Les médicaments sont pro-inflammatoires
 - Les médicaments sont des haptènes
 - Les hypersensibilités type I à IV de Gell & Coombs
- Démarche diagnostique et bilan allergologique
- HS immédiate (type I)
 - Mastocytes
 - Anaphylaxie
 - Urticaire
- HS retardée (type IV)
 - Toxidermies

Que retenir ?

- L'allergie au travail et au conjoint n'est pas de l'allergie
- Les médicaments sont des produits chimiques; les produits chimiques sont des produits toxiques (xénobiotiques) pro-inflammatoires
- Préférer Hypersensibilité à Allergie comme diagnostic initial
- Les médicaments peuvent donner tous les types d'HS (I à IV)
- Quand on est allergique à tout, on est allergique à rien
- Moins on prend de médicament, mieux on se porte
- Préférer Œdème du visage à Œdème de Quincke
- Éviter les corticoïdes/ Préférer les anti-H1
- La majorité des réactions d'HS aux médicaments sont non allergiques et n'empêcheront pas la prise de médicaments si nécessaire

■■■■■ Danièle
 7 Cote Camagnac
 69 ■■■■■
 tel ■■■■■

le 11 Mai 2003

Docteur Nicolas,
 Mon fils Yves a rendez-vous le 25 Juin
 pour des tests. Il est né le 8 Janvier 1983, et a
 fait un urticaire géant au Clamoxyl en 1986,
 donc on a évité cet antibiotique. Le 22 Décembre
 dernier, il a fait un œdème de Quincke,

Quand on est allergique à tout, on est allergique à rien

■■■■■ n'avait pris ni clamoxyl, ni érythrogel,
 ni aucun médicament, et il a refait un
œdème de Quincke. J'ai donc noté qu'il
 avait mangé = du nougat chinois, concombres,
 tomates, betteraves, magret de Canard, sauce au
 poivre vert, mangues, lichies, cornée et pâtes.
 Il y avait aussi un très gros bouquet de
 tulipes posé près de lui, avec des jonquilles.
 Désolé d'avoir dû changer le rendez-

HS aux médicaments - Plan

- Introduction
- Hypersensibilité allergique et non allergique
 - Immunité innée et adaptative
 - Physiopathologie
 - Les médicaments sont pro-inflammatoires
 - Les médicaments sont des haptènes
 - Les hypersensibilités type I à IV de Gell & Coombs
- Démarche diagnostique et bilan allergologique
- HS immédiate (type I)
 - Mastocytes
 - Anaphylaxie
 - Urticaire
- HS retardée (type IV)
 - Toxidermies

Hypersensibilités
Classification de Gell & Coombs

	Antibody			T cells			
	Type I	Type II	Type III	Type IVa	Type IVb	Type IVc	Type IVd
Immune reactant	IgE	IgG	IgG	IFN- γ , TNF- α Th1/Type 1	IL-5, IL-4/IL-13 Th2/Type 2	Perforin/ granzyme B Cytotoxic	CXCL8, Th17/Type 17
Antigen	Soluble antigen	Cell- or matrix-associated antigen	Soluble antigen	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Cell-associated antigen or direct T-cell stimulation	Soluble antigen presented by cells or direct T-cell stimulation
Effector	Mast cell activation	FcR+ cells (phagocytes, NK cells)	FcR+ cells Complement	Macrophage activation	Eosinophils	T cells	Neutrophils

Maladies autoimmunes et allergiques	Anaphylaxie Rhinite allergique Asthme (crise)	Réaction transf. Anémie hémol. Thyroïdite Myasthénie	Maladie sérique Lupus érythémateux	IDR tuberculine Rejet de greffe Polyarthrite Diabète	Asthme chron. Rhinite chron.	Rejet de greffe Diabète SEP	Polyarthrite Sclérose en plaque Mal. de Crohn
Dermatoses autoimmunes et allergiques	Urticaire contact	Pemphigus Pemphigoides Urticaire chron.	Vasculaites	Psoriasis	Dermatite atopique	Vitiligo Pelade Eczéma contact	Psoriasis
Allergies médicaments	Choc anaphylactique	Cytopenies medic.	Vasculaites immuno-allerg.	Exanthème medic.	DRESS	Lyell Stevens-Johnson	

HS aux médicaments - Plan

- Introduction
- Hypersensibilité allergique et non allergique
 - Immunité innée et adaptative
 - Physiopathologie
 - Les médicaments sont pro-inflammatoires
 - Les médicaments sont des haptènes
 - Les hypersensibilités type I à IV de Gell & Coombs
- Démarche diagnostique et bilan allergologique
- HS immédiate (type I)
 - Mastocytes
 - Anaphylaxie
 - Urticaire
- HS retardée (type IV)
 - Toxidermies

HS aux médicaments - Plan

- Introduction
- Hypersensibilité allergique et non allergique
 - Immunité innée et adaptative
 - Physiopathologie
 - Les médicaments sont pro-inflammatoires
 - Les médicaments sont des haptènes
 - Les hypersensibilités type I à IV de Gell & Coombs
- Démarche diagnostique et bilan allergologique
- HS immédiate (type I)
 - Mastocytes
 - Anaphylaxie
 - Urticaire
- HS retardée (type IV)
 - Toxidermies
- Induction de tolérance

Physiopathologie des Hypersensibilités

Effets indésirables immunologiques des médicaments: aspects cliniques

Hypersensibilités
Classification de Gell & Coombs

	Antibody			T cells			
	Type I	Type II	Type III	Type IVa	Type IVb	Type IVc	Type IVd
Immune reactant	IgE	IgG	IgG	IFN- γ , TNF- α Th1/Type 1	IL-5, IL-4/IL-13 Th2/Type 2	Perforin/ granzyme B Cytotoxic	CXCL8, Th17/Type 17
Antigen	Soluble antigen	Cell- or matrix-associated antigen	Soluble antigen	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Cell-associated antigen or direct T-cell stimulation	Soluble antigen presented by cells or direct T-cell stimulation
Effector	Mast cell activation	FcR+ cells (phagocytes, NK cells)	FcR+ cells Complement	Macrophage activation	Eosinophils	T cells	Neutrophils
Maladies auto-immunes et allergiques	Anaphylaxie Rinite allergique Asthme (crise)	Réaction transf. Anémie hémol. Thyroïdite Myasthénie	Maladie sérique Lupus érythémateux	IDR tuberculine Rejet de greffe Polyarthrite Diabète	Asthme chron. Rinite chron.	Rejet de greffe Diabète SEP	Polyarthrite Sclérose en plaque Mal. de Crohn
Dermatoses auto-immunes et allergiques	Urticaire contact	Pemphigus Pemphigoides Urticaire chron.	Vasculitites	Psoriasis	Dermatite atopique	Vitiligo Pellagre Eczéma contact	Psoriasis
Allergies médicaments	Choc anaphylactique	Cytopenies medic.	Vasculitites immuno-allerg.	Exanthème medic.	DRESS	Lyell Stevens-Johnson	

TYPE I HYPERSENSITIVITY

effets pharmacologiques
vasoaux sanguins
voies aeriennes etc
infiltration cellulaire
(voir fig. 22.14 et 22.20)

effets cliniques
rhume des foies
asthme
eczema
anaphylaxie

activation des mastocytes → libération de médiateurs → effets cliniques

TYPE I HYPERSENSITIVITY

Œdème du derme / Vaisseaux

Non allergic IHS

Allergic IHS

Mastocytes / Histamine

Identification of a mast-cell-specific receptor crucial for pseudo-allergic drug reactions

Benjamin D. McNeil¹, Priyanka Pundir², Sonya Meeker³, Liang Han¹, Bradley J. Udem³, Marianna Kulka^{2,4} & Xinzhong Dong^{1,5}

Mast cells are primary effectors in allergic reactions, and may have important roles in disease by secreting histamine and various inflammatory and immunomodulatory substances^{1,2}. Although they are classically activated by immunoglobulin (Ig)E antibodies, a unique property of mast cells is their antibody-independent responsiveness to a range of cationic substances, collectively called basic secretagogues, including inflammatory peptides and drugs associated with allergic-type reactions^{1,3}. The pathogenic roles of these substances have prompted a decades-long search for their receptor(s). Here we report that basic secretagogues activate mouse mast cells *in vitro* and *in vivo* through a single receptor, Mrgprb2, the orthologue of the human G-protein-coupled receptor MRGPRX2. Secretagogue-induced histamine release, inflammation and airway contraction are abolished in Mrgprb2-null mutant mice. Furthermore, we show that most classes of US Food and Drug Administration (FDA)-approved peptidergic drugs associated with allergic-type injection-site reactions also activate Mrgprb2 and MRGPRX2, and that injection-site inflammation is absent in mutant mice. Finally, we determine that Mrgprb2 and MRGPRX2 are targets of many small-molecule drugs associated with systemic pseudo-allergic, or anaphylactoid, reactions;

we show that drug-induced symptoms of anaphylactoid responses are significantly reduced in knockout mice; and we identify a common chemical motif in several of these molecules that may help predict side effects of other compounds. These discoveries introduce a mouse model to study mast cell activation by basic secretagogues and identify MRGPRX2 as a potential therapeutic target to reduce a subset of drug-induced adverse effects.

Substance	Mrgprb2 EC ₅₀	MRGPRX2 EC ₅₀
Compound 48/80	3.7 ± 0.5 µg/ml	470.1 ± 139.6 ng/ml
Substance P	54.3 ± 4.9 µM	152.3 ± 48.0 nM
Cortistatin-14	21.3 ± 0.9 µM	106.7 ± 39.3 nM
PAMP (9-20)	12.4 ± 1.6 µM	166.0 ± 35.7 nM
Mastoparan	24.0 ± 3.6 µM	3.9 ± 0.7 µM
Icatibant	32.5 ± 2.0 µg/ml	15.8 ± 2.7 µg/ml
Cetorelix	23.4 ± 1.4 µg/ml	221.7 ± 63.1 ng/ml
Sermorelin	29.1 ± 1.2 µg/ml	4.5 ± 0.9 µg/ml
Octreotide	10.0 ± 1.1 µg/ml	6.6 ± 0.7 µg/ml
Leuprolide	152.0 ± 7.1 µg/ml	9.1 ± 0.7 µg/ml
Atracurium	44.8 ± 1.4 µg/ml	28.6 ± 2.4 µg/ml
Rocuronium	22.2 ± 3.3 µg/ml	261.3 ± 14.4 µg/ml
Ciprofloxacin	126.5 ± 5.1 µg/ml	6.8 ± 0.5 µg/ml
Moxifloxacin	14.1 ± 2.1 µg/ml	9.9 ± 0.6 µg/ml
Levofloxacin	807.6 ± 47.1 µg/ml	22.7 ± 0.4 µg/ml
Ofloxacin	225.0 ± 25.4 µg/ml	30.1 ± 1.5 µg/ml

Figure 4 | Mrgprb2 mediates mast cell responsiveness and side effects of small-molecule therapeutic drugs. **a**, Structures of 48/80 and a cyclized variant. The THIQ motif is highlighted in blue. **b**, Structures of representative members of all NMBD classes (see Supplementary Information). THIQ motifs are highlighted in blue. Note that only succinylcholine lacks a bulky hydrophobic group. **c**, Percentage of responding cells from wild-type (WT) and Mrgprb2^{MUT} (MUT) peritoneal mast cells after application of various NMBDs, assayed using Fluo-4 imaging. Concentrations of drugs (in µg ml⁻¹): atracurium, 50; mivacurium, 20; tubocurarine, 30; rocuronium, 500. **d**, Structure of ciprofloxacin, with the motif common to all fluoroquinolones highlighted in blue. Note the nitrogens close to the quinolone motif. **e**, Percentage of responding cells from wild-type and Mrgprb2^{MUT} peritoneal mast cells after fluoroquinolone application, assayed using Fluo-4 imaging. Concentrations of drugs (in µg ml⁻¹): ciprofloxacin, 200; levofloxacin, 500; moxifloxacin, 160; ofloxacin, 400. **f**, *n* = 3 mice per genotype; >150 cells counted per substance. **f**, Changes in body temperature after intravenous injection of ciprofloxacin (1.5 mg in 125 µl saline) at time 0. *n* = 4 mice per genotype. Data are presented as mean ± s.e.m. Two-tailed unpaired Student's *t*-test; **P* < 0.05, ***P* < 0.01.

- Récepteur non sélectif
- Tous les mastocytes n'expriment pas MRGPRX2
- Variants avec gain ou perte de fonction de MRGPRX2
- Lie des peptides et molécules aux propriétés physico-chimiques particulières (Cationique, Hydrophobiques)

- Peptides toxines
- Neuropeptides
- Peptides anti-microbiens
- Other endogenous peptides: kallicreine
- Peptides médicaments
- Self-peptides dégradés des protéines

Cell-specific receptor crucial reactions

Han¹, Bradley J. Undem³, Marianna Kulka^{2,4} & Xinzhong Dong^{1,5}

We show that drug-induced symptoms of anaphylactoid responses are significantly reduced in knockout mice; and we identify a common chemical motif in several of these molecules that may help predict side effects of other compounds. These discoveries introduce a mouse model to study mast cell activation by basic secretagogues and identify MRGPRX2 as a potential therapeutic target to reduce a subset of drug-induced adverse effects.

Substance	Mrgprb2 EC ₅₀	MRGPRX2 EC ₅₀
Compound 48/80	3.7 ± 0.5 µg/ml	470.1 ± 139.6 ng/ml
Substance P	54.3 ± 4.9 µM	152.3 ± 48.0 nM
Cortistatin-14	21.3 ± 0.9 µM	106.7 ± 39.3 nM
PAMP (9-20)	12.4 ± 1.6 µM	166.0 ± 35.7 nM
Mastoparan	24.0 ± 3.6 µM	3.9 ± 0.7 µM
Icatibant	32.5 ± 2.0 µg/ml	15.8 ± 2.7 µg/ml
Cetorelix	23.4 ± 1.4 µg/ml	221.7 ± 63.1 ng/ml
Sermorelin	29.1 ± 1.2 µg/ml	4.5 ± 0.9 µg/ml
Octreotide	10.0 ± 1.1 µg/ml	6.6 ± 0.7 µg/ml
Leuprolide	152.0 ± 7.1 µg/ml	9.1 ± 0.7 µg/ml
Atracurium	44.8 ± 1.4 µg/ml	28.6 ± 2.4 µg/ml
Rocuronium	22.2 ± 3.3 µg/ml	261.3 ± 14.4 µg/ml
Ciprofloxacin	126.5 ± 5.1 µg/ml	6.8 ± 0.5 µg/ml
Moxifloxacin	14.1 ± 2.1 µg/ml	9.9 ± 0.6 µg/ml
Levofloxacin	807.6 ± 47.1 µg/ml	22.7 ± 0.4 µg/ml
Ofloxacin	225.0 ± 25.4 µg/ml	30.1 ± 1.5 µg/ml

MASTOCYTES

Récepteurs et activation

Urticaire simple

Urticaire simple ou non

Urticaire/Oedème segmentaire du visage Œdème de Quincke

URTICAIRE A ASPIRINE/AINS

- Urticaire généralisée et angioedème
- Pas de signe de gravité
- ATCDs d'urticaire fraises/crustacés

BILAN IMMUNOALLERGO NEG.
(pricks, IDR 1:1000 puis 1:100)

REINTRODUCTION ASPIRINE OK
(anti-H1 +/- anti-leucotriènes)

INTOLERANCE A ASPIRINE/AINS

- Syn. de Widal (polypose nasale, asthme intrinsèque, rhinite, urticaire)
- due à l'activité anti-cox des AINS

INTOLERANCE AUX MEDICAMENTS

Antibiotiques, AL et AG, AINS,
Codéine, Produits de contraste

HYPERSENSIBILITÉ AUX MÉDICAMENTS

Urticaire et angio-œdème induits par les médicaments

Le plus souvent non allergique et favorisés par des situations à risque

MARION
BRAIRE-BOURREL*
FRÉDÉRIC AUGÉY*
MARIE-SYLVE
DOUTRE**

1. Université Lyon 1,
Hôpitaux de Lyon,
Inserm U1111 – CIRI
2. Service de
dermatologie,
hôpital Haut-Lévêque,
CHU de Bordeaux,
Pessac, France.
Correspondance *

L'urticaire est l'une des affections dermatologiques les plus fréquentes : 15-20 % de la population a au moins une poussée au cours de sa vie et 2 % de la population souffre d'urticaire chronique. L'urticaire motive 1 à 2 % des consultations de dermatologie et d'allergologie.¹ L'urticaire médicamenteuse est, en termes de fréquence, la deuxième manifestation clinique liée aux médicaments après l'exanthème maculo-papuleux.² Un mécanisme allergique est rare, en cause dans moins de 10 % des cas.² L'urticaire médicamenteuse se présente sous forme d'urticaire aiguës dont le médiateur principal est l'histamine, que le mécanisme soit allergique ou non. Les angio-œdèmes hémodynamiques sont des entités cliniques

l'angio-œdème peuvent évoluer isolément ou en association :

- l'urticaire allergique peut s'associer à un choc anaphylactique. Ce tableau brutal, volontiers précédé d'un prurit intense des paumes, des plantes et du cuir chevelu, associe dans sa forme complète : hypotension (pression artérielle systolique $\leq$ 80 mmHg, souvent $\leq$ 50 mmHg), tachycardie, bronchospasme, douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, sensation de mort imminente et/ou perte de connaissance. En raison du risque vital, sa prise en charge doit être rapide, dans un délai inférieur à 30 minutes. Dans ce cas, l'urticaire est souvent au second plan et peut passer inaperçue.²

URTICAIRES INDUITES PAR LES MÉDICAMENTS

-HS Allergiques (IgE): rares et
exceptionnellement isolées

-HS non allergique: fréquentes et
souvent bénignes

Anaphylaxie – Œdème de Quincke

Anaphylaxie systémique et choc anaphylactique médicamenteux

Un bilan allergologique s'impose 4 à 6 semaines après

Le terme « anaphylaxie » ne préjuge pas du mécanisme responsable de l'activation mastocytaire : mécanisme dépendant des immunoglobulines de type E (IgE) correspondant à l'allergie immédiate (v. p. 969) ; mécanisme indépendant des IgE que l'on appelait auparavant « réaction anaphylactoïde ». Dans ce cas, la dégranulation mastocytaire peut être induite, soit par des médicaments dits histamino-libérateurs (vancomycine) ; soit par activation de récepteurs mastocytaires autres que les récepteurs des IgE, comme les complexes immuns circulants formés d'IgG anti-médicament, les composés du complément (C3a, C5a appelés anaphylatoxines), ou des récepteurs spécifiques à certains médicaments (opiacés, par exemple morphine et codéine) ; soit, enfin, par activation de la phase contact et/ou du système bradykinine/kallikréine (v. figure p. 973).

Les symptômes sont identiques dans ces deux formes physiopathologiques et la prise en charge en

urgence est la même. C'est le bilan allergologique réalisé après la résolution de l'accident qui permet de faire la différence.

Épidémiologie de l'anaphylaxie médicamenteuse

L'anaphylaxie médicamenteuse touche plus souvent l'adulte (90 %) que l'enfant (10 %) ; 80 % des anaphylaxies médicamenteuses surviennent en ambulatoire et 20 % durant une anesthésie. Dans cet ensemble, les médicaments responsables des formes sévères (grade > 2) sont : antibiotiques (50 %), curares, latex et anesthésiques généraux (15 %), anti-inflammatoires non stéroïdiens (10 %), paracétamol (4 %), produits de contraste iodés et pour imagerie par résonance magnétique (4 %), immunothérapies et vaccins (4 %) et autres médicaments (10 %). Parmi les antibiotiques, l'amoxicilline représente plus de 50 % des cas d'anaphylaxie, suivie par les

FOCUS

Bilan allergologique de l'anaphylaxie

Les explorations allergologiques doivent être réalisées au plus tôt 4 à 6 semaines après l'accident, afin d'éviter les tests faux négatifs secondaires à l'« épuisement mastocytaire » post-anaphylactique.

L'exploration de l'anaphylaxie repose sur :

- **un interrogatoire rigoureux** : le type de symptômes présentés, la nature du médicament, le délai d'apparition des symptômes après exposition allergénique, la durée des symptômes sont très utiles au diagnostic rétrospectif d'anaphylaxie.

L'imputabilité intrinsèque est établie à partir des données de l'histoire clinique. Une réaction anaphylactique est d'autant plus suspecte d'être allergique que le délai d'apparition des symptômes est court (quelques secondes ou minutes lorsque le médicament est injecté jusqu'à une heure maximum en cas d'ingestion) et que la durée des symptômes est brève (classiquement inférieure à 6 heures).

L'imputabilité extrinsèque est établie à partir des données de la littérature sur

son allergénicité ; on sait notamment que les bêta-lactamines sont la principale cause d'hypersensibilité médicamenteuse, suivie par les quinolones et les glycopeptides ;

- **des tests cutanés dits « immédiats »** : prick-tests et parfois intradermoréactions. Le prick-test consiste à appliquer sur la face antérieure de l'avant-bras une solution du médicament (disponible sous forme injectable ou préparée par la pharmacie hospitalière pour les médicaments non injectables), et à piquer à travers la goutte avec une aiguille calibrée de façon à introduire une quantité infime du produit à tester dans le derme. Le patient allergique, dont les IgE spécifiques recouvrent la surface des mastocytes cutanés, développe très rapidement une réaction urticarienne qui sera lue à 20 minutes (cf. figure). Des contrôles négatifs (diluant) et positifs (histamine) sont réalisés et permettent de faire le diagnostic de sensibilisation à l'allergène testé. Les intradermoréactions sont réservées aux services hospitaliers spécialisés ;

- **des tests biologiques** : le dosage

d'IgE sériques spécifiques est actuellement possible pour le latex, les curares et certaines bêta-lactamines ; le test d'activation des basophiles apporte également aujourd'hui une aide précieuse dans le diagnostic. Il consiste à incuber le sang des patients avec l'allergène puis à détecter par cytométrie de flux les basophiles activés via leurs marqueurs membranaires.

Figure. PRICK-TESTS MÉDICAMENTEUX. Le patient a eu une anaphylaxie grade II, 5 minutes après la prise d'un comprimé d'amoxicilline 1 g en prophylaxie anti-infectieuse après une chirurgie dentaire. Trois médicaments ont été testés : amoxicilline (test positif), ceftriaxone (tests négatifs), ainsi que 2 contrôles positifs (histamine et codéine) et un contrôle négatif (diluant des tests).

CHOC A AMOXICILLINE

- Bronchospasme
- Défaillance cardiaque
- Adrénaline nécessaire

- Urticaire au second plan, après érythème généralisé

BILAN IMMUNOALLERGO
(pricks, IDR 1:1000 puis 1:100)

- Amox, ampi positifs
- C1G positif
- C2G et C3G négatifs

C3G DONNEE SANS PROBLEME

CHOC AUX CORTICOIDES

3 accidents de + en + sévères
après CS intra-articulaires

Kenacort, *triamcinolone*
Diprostène, *bethaméthasone*
Altim, *cortivazol*

- Bronchospasme
- Défaillance cardiaque
- Adrénaline nécessaire

Aucune faute médicale

BILAN IMMUNOALLERGO
(pricks, IDR 1:1000 puis 1:100)
HSI à la carboxymethylcellulose

CS avec CMC pos, CMC pos
CS sans CMC négatifs

- Service Allergologie Lyon-Sud
- INSERM U1111- CIRI
- Institut de biologie et de chimie des protéines

Nouvelle classification BL : Dendrogramme

- 42 BL
- Modélisation moléculaire
- Alignement sur le noyau Béta-lactame³

Pénicilline

Céphalosporine

- Objet: A l'attention du Dr J.F. NICOLAS - Merci
- Date: Wed, 22 Sep 2004 19:39:55 +0200
- De: « gdf" <gfh@li
- Monsieur,
- Je vous adresse, comme convenu lors de la consultation du mois de juillet, les photos de ma fille, Solène G , prises lors de son épisode d'urticaire géant. Pour information, elle est donc venue en hôpital de jour ce 17.09 au CHU de Lyon, où lui a été administré un des médicaments pris en juin, pour contrôle. Celui-ci n'a rien donné. Hier, elle a eu une crise de démangeaisons sur l'ensemble du corps, qui a cédé après une prise de XYZAL. Merci pour votre attention. Meilleures salutations.
Elisabeth C

Urticaire induite par médicaments

- 350 patients bilantés entre avril 00 et mai 01
- Interrogatoire, dermographisme, tests cutanés (prick et IDR), hospitalisation
- Tests + : HSI (IgE) -> éviction, médicament de remplacement
 - 22 patients sur 350
 - urticaire isolée exceptionnelle (1 cas)
 - Manifestations systémiques (choc, asthme, tr.digestifs)
- Tests -: pseudo-allergie -> réintroduction
 - 328 patients sur 350
 - Urticaire isolée 95% des cas
 - ATCDs d'urticaire ou existence d'U chronique

Cher confrère,

Je vous remercie de bien vouloir recevoir en consultation madame Nicole [redacted] [redacted] rant La

Je la connais depuis peu.

Elle me dit présenter des allergies à type d'urticaire à de nombreux antibiotiques (AMOX, FQ, ORELOX, RULID, BACTRIM) : oedème de la bouche avec chapelet d'aphtes. Il semble que le RULID n'ait entraîné que des macules.

Elle me dit que ces réactions n'apparaissent que depuis 4 ans.

J'ai dû lui prescrire un Aminoside (Gentalline) en IV lente à domicile en mars pour une infection urinaire basse résistante à Furadantine.

Pourriez-vous tester ces produits pour qu'on puisse établir la liste des antibiotiques qu'il faut absolument proscrire, ou ceux qu'on pourrait utiliser sous couverture d'antihistaminique par exemple, car c'est bien embêtant pour trouver une antibiothérapie adéquate en cas d'infection, même la + banale.

En ALD pour I Cardiaque.

TTT en cours : CARDENSIEL, ALDALIX, ATACAND, PRAVADUAL, PROTHIADEN, LYSANXIA, OGAST, FORLAX et DOLIPRANE à la demande.

En vous remerciant de ce que vous ferez pour cette patiente,
Très confraternellement à vous.

LYON, le Lundi 18 Avril 2011

Cher Confrère,

Je vous adresse pour avis Madame [REDACTED], 72 ans, qui présente de multiples allergies médicamenteuses dont un œdème de Quincke sous pénicilline.

Moins on prend de médicaments, mieux on se porte

Ses allergies sont : néomycine
mercure, chrome
macrolides
quinolones
surgam
art 50
doxycycline
PENICILLINE

Ses ATCD sont :
Antécédents Médicaux
Hypothyroïdie HASHIMOTO, Dr Bernard

POINTS IMPORTANTS

- On ne peut pas être allergique à tous les médicaments. En revanche, certains individus peuvent être sensibles à beaucoup de médicaments et développent des réactions aiguës, en particulier urticaire et œdème.
- Les patients ayant un terrain d'urticaire chronique sont nombreux. Ils ont une fragilité des mastocytes cutanés qui peuvent dégranuler et donner urticaire et œdème lors de prise de médicaments qui exercent leur « effet adjuvant ». Une urticaire/œdème isolé, c'est-à-dire sans signe systémique d'anaphylaxie, que les dermatologues appellent « urticaire segmentaire du visage », n'est pas allergique.

HS aux médicaments - Plan

- Introduction
- Hypersensibilité allergique et non allergique
 - Immunité innée et adaptative
 - Physiopathologie
 - Les médicaments sont pro-inflammatoires
 - Les médicaments sont des haptènes
 - Les hypersensibilités type I à IV de Gell & Coombs
- Démarche diagnostique et bilan allergologique
- HS immédiate (type I)
 - Mastocytes
 - Anaphylaxie
 - Urticaire
- HS retardée (type IV)
 - Toxidermies

Hypersensibilités
Classification de Gell & Coombs

	Antibody			T cells			
	Type I	Type II	Type III	Type IVa	Type IVb	Type IVc	Type IVd
Immune reactant	IgE	IgG	IgG	IFN- γ , TNF- α Th1/Type 1	IL-5, IL-4/IL-13 Th2/Type 2	Perforin/ granzyme B Cytotoxic	CXCL8, Th17/Type 17
Antigen	Soluble antigen	Cell- or matrix-associated antigen	Soluble antigen	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Cell-associated antigen or direct T-cell stimulation	Soluble antigen presented by cells or direct T-cell stimulation
Effector	Mast cell activation	Fc ϵ R+ cells (phagocytes, NK cells)	Fc γ R+ cells Complement	Macrophage activation	Eosinophils	T cells	Neutrophils
Maladies auto-immunes et allergiques	Anaphylaxie Rinite allergique Asthme (crise)	Réaction transf. Anémie hémol. Thyroïdite Myasthénie	Maladie sérique Lupus érythémateux	IDR tuberculine Rejet de greffe Polyarthrite Diabète	Asthme chron. Rinite chron.	Rejet de greffe Diabète SEP	Polyarthrite Sclérose en plaque Mal. de Crohn
Dermatoses auto-immunes et allergiques	Urticaire contact	Pemphigus Pemphigoides Urticaire chron.	Vasculaites	Psoriasis	Dermatite atopique	Vitiligo Pélade Eczéma contact	Psoriasis
Allergies médicaments	Choc anaphylactique	Cytopénies medic.	Vasculaites immuno-allerg.	Exanthème medic.	DRESS	Lyell Stevens-Johnson

Hypersensibilité de type III due à des complexes immuns VASCULITES – PURPURA RHUMATOIDE

Type III

dépôt de complexes immuns

C

tissu

membrane basale

vaisseau sanguin

Hypersensibilités
Classification de Gell & Coombs

	Antibody			T cells			
	Type I	Type II	Type III	Type IVa	Type IVb	Type IVc	Type IVd
Immune reactant	IgE	IgG	IgG	IFN- γ , TNF- α Th1/Type 1	IL-5, IL-4/IL-13 Th2/Type 2	Perforin/ granzyme B Cytotoxic	CXCL8, Th17/Type 17
Antigen	Soluble antigen	Cell- or matrix-associated antigen	Soluble antigen	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Antigen presented by cells or direct T-cell stimulation	Cell-associated antigen or direct T-cell stimulation	Soluble antigen presented by cells or direct T-cell stimulation
Effector	Mast cell activation	Fc γ cells (phagocytes, NK cells)	Fc γ cells Complement	Macrophage activation	Eosinophils	T cells	Neutrophils
Maladies autoimmunes et allergiques	Anaphylaxie Rhinite allergique Asthme (crise)	Réaction transf. Anémie hémol. Thyroïdite Myasthénie	Maladie sérique Lupus érythémateux	IDR tuberculine Rejet de greffe Polyarthrite Diabète	Asthme chron. Rhinite chron.	Rejet de greffe Diabète SEP	Polyarthrite Sclérose en plaque Mal. de Crohn
Dermatoses autoimmunes et allergiques	Urticaire contact	Pemphigus Pemphigoides Urticaire chron.	Vasculaites	Psoriasis	Dermatite atopique	Vitiligo Pellade Eczéma contact	Psoriasis
Allergies médicaments	Choc anaphylactique	Cytopenies medic.	Vasculaites immuno-allerg.	Exanthème medic.	DRESS	Lyell Stevens-Johnson	

Toxidermies

1	2	3	4	5	6	7

Severity	Prevalence
<p>SEVERE</p> <p>1 - TEN: Toxic Epidermal Necrolysis</p> <p>MODERATE</p> <p>2 - DRESS: Drug Rash with Eosino & Systemic symptoms</p> <p>3 - AGEP: Acute Generalized Exanthematous Pustulosis</p>	<p>4 - FDE: Fixed Drug Eruption</p> <p>5 - Generalized Erythema multiform</p> <p>6 - Linear IgA Dermatitis</p> <p>MILD</p> <p>7 - MPE: Maculo-papular exanthema</p>

Objectives.
To characterize the phenotype and functions of skin infiltrating T cells

HYPERSENSIBILITÉ AUX MÉDICAMENTS

Exanthèmes médicamenteux et toxidermies sévères

Signes généraux et muqueux imposent l'arrêt immédiat du médicament

Les hypersensibilités retardées aux médicaments peuvent toucher tous les organes mais la peau est certainement celui le plus fréquemment atteint. Elles surviennent quelques heures, jours ou semaines après la prise de médicaments et se manifestent par un exanthème, plus ou moins oedémateux, la survenue de bulles et/ou de décollements cutanés. On parle souvent de « toxidermies » pour décrire ces atteintes cutanées. Le [tableau \(r.p. 982\)](#) donne les caractéristiques des principales toxidermies. Le bilan allergologique qui comprend des tests cutanés (patch-tests et intradermoréactions), des tests biologiques (tests de prolifération et/ou d'activation lymphocytaire) et des tests de réintroduction dans les formes bénignes, permet de différencier hypersensibilité retardée allergique et non allergique et de proposer aux patients des alternatives thérapeutiques.

symptoms) ou une nécrolyse épidermique toxique.

L'évolution est en général favorable en 1 à 4 semaines après arrêt et élimination du médicament, laissant la place à une desquamation sans séquelle.

Tous les médicaments peuvent induire un exanthème, en particulier les antibiotiques et plus spécialement les pénicillines.

Diagnostic différentiel

Dans tous les cas il est important d'éliminer un exanthème infectieux, en particulier viral (infection par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] chez l'adulte jeune ou mononucléose infectieuse),⁷ en sachant que l'infection et la fièvre sont des cofacteurs souvent nécessaires au développement d'un exanthème médicamenteux. Cette association infection virale et exanthème aux pénicillines est classique au cours de la primo-infection par le virus d'Epstein-Barr (EBV ou *human herpes virus-4* [HHV4]).

BENOÎT BENSÂÏD*
LAURENCE
VALENTINE
ALLANORE**
BÉNÉDICTE
LEBRUN-VIGNES***
JEAN-FRANÇOIS
NICOLAS*

* Service allergologie et immunologie clinique, CHU de Lyon, centre de compétences - allergie aux médicaments - , université Lyon 1, Inserm U1111-CIRI, Hôpitaux de Lyon.

Cf topo Dr Ben Said

TOXIDERMIES
LYELL

7. Toxidermie érythémateuse Exanthèmes

- **Physiopathologie:** hypersensibilité retardée médiée par les LT
- **Incidence :** inconnue
- **Délai :** 1 à 21 jours
- **Clinique:**
 - Fièvre possible
 - Eruption maculo-papuleuse prurigineuse parfois bulleuse
 - Début au niveau des plis puis extension, jusqu'à l'érythrodermie
- **Biologie :** hyperéosinophilie
- **Atteinte viscérale:** rein, foie
- **Histologie :** infiltrat dermique lymphocytaire et à éosinophiles, vacuolisation de la membrane basale, nécrose kératinocytaire, exocytose lymphocytaire, spongieuse.
- **Médicaments :** pénicillines, sulfamides, céphalosporines, antituberculeux, anticomitiaux, allopurinol, sel d'or, captopril, AINS, phénothiazine
- **Guérison :** 1 à 3 semaines avec desquamation
- **Mortalité :** non connue

Toxidermie érythémateuse Pénicilline G

Toxidermie érythémateuse
Après Clamoxyl, Feldene,
Remplacé par Bactrim, Surgam

Toxidermie érythémateuse Pénicilline M

- Oxacillin-induced MPE
- pos patch test to oxa
- neg patch test to ceftriaxone

- Second patch testing with oxa and ceft.
- Biopsies at 12h (early) and 48h (late)

DRESS Pénicilline A

Conclusion Toxidermies sévères

- Savoir reconnaître les toxidermies sévères
 - Nécessité d'un diagnostic précoce
 - Des pathologies polymorphes à risque de séquelles
- Une prise en charge mieux codifiée
 - Pour certaines toxidermies (SJS-TEN et DRESS)
 - Apport des réseaux loco-régionaux (CCR2A) et internationaux (RegiSCAR)

HYPERSENSIBILITÉ AUX MÉDICAMENTS

Induction de tolérance aux médicaments

D'excellents résultats quand le médicament est indispensable

**FLORENCE HACARD
FRÉDÉRIC BÉRARD**
Service allergologie
et immunologie
clinique, Hôpitaux
de Lyon, CH Lyon-Sud,
université Lyon 1,
Inserm U1111/CHRL,
Pierre-Bénite, France.
flore.hacard
@chu-lyon.fr
frederic.berard
@chu-lyon.fr

F. Bérard et
F. Hacard déclarent
n'avoir aucun
lien d'intérêts.

Que l'hypersensibilité soit allergique ou non allergique, il peut arriver que le médicament soit indispensable à un patient, sans possibilité de remplacement. L'induction de tolérance est alors un moyen permettant la prise d'un traitement en forçant l'organisme à tolérer ce médicament. Elle est particulièrement adaptée aux chimiothérapies anticancéreuses, à l'aspirine et aux antibiotiques.

Synonymes

Immunothérapie allergénique, immunothérapie spécifique, désensibilisation ou induction de tolérance, tous ces termes sont synonymes et ont pour but de permettre à un patient hypersensible de pouvoir être à nouveau exposé à un allergène sans déclencher de réaction d'hypersensibilité. Le principe de l'immunothérapie spécifique dans l'allergie respiratoire et de la désensibilisation dans l'allergie alimentaire est identique à celui

et le protocole doit être recommencé si le médicament doit être repris. Cette tolérance temporaire doit être expliquée au patient pour que l'observance du traitement soit garantie.³

Mécanismes de l'induction de tolérance

L'induction de tolérance induit un ensemble de modifications cellulaires et moléculaires qui aboutissent, à l'issue du protocole, à l'augmentation du seuil d'activation des mastocytes et à l'activation des lymphocytes régulateurs/suppresseurs.

Tolérisation mastocytaire et basophile

L'augmentation du seuil d'activation des mastocytes les empêche de dégranuler et donc d'initier une réaction d'hypersensibilité immédiate.

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer la tolérisation des mastocytes : l'exposition des

HYPERSENSIBILITÉ AUX MÉDICAMENTS

Figure. ALGORITHME DÉCISIONNEL D'UNE INDUCTION DE TOLÉRANCE. D'après la réf. 2.

La figure expose la démarche clinique permettant de poser l'indication d'induction de tolérance qui est fonction de la sévérité de l'accident et du caractère allergique ou non de la réaction.

Les indications d'induction de tolérance sont les hypersensibilités immédiates sévères et/ou allergiques et les hypersensibilités retardées non sévères (exanthèmes maculo-papuleux, érythèmes polymorphes).

Que retenir ?

- Les médicaments sont des produits chimiques; les produits chimiques sont des produits toxiques (xénobiotiques) pro-inflammatoires
- Préférer Hypersensibilité à Allergie comme diagnostic initial
- Les médicaments peuvent donner tous les types d'HS (I à IV)
- L'allergie au travail et au conjoint n'est pas de l'allergie
- Quand on est allergique à tout, on est allergique à rien
- Moins on prend de médicament, mieux on se porte
- Préférer Œdème du visage à Œdème de Quincke
- Éviter les corticoïdes/ Préférer les anti-H1
- La majorité des réactions d'HS aux médicaments sont non allergiques et n'empêcheront pas la prise de médicaments si nécessaire