

VACCINATION COVID-19


PROCÉDURE ACTUELLE DANS LE SERVICE

COLLOQUE

12/01/22

Pr Bérard - Dr Hacard

- Service d'Allergologie et Immunologie Clinique, Centre Hospitalier Lyon-Sud
INSERM U1111, Centre International de Recherche en Infectiologie – CIRI



Lyon 1

HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON



Inserm

La science pour la santé
From science to health

www.chu-lyon.fr

RECOMMANDATIONS DE LA SFA

Vaccination contre la Covid-19 et antécédents allergiques.

Résumé des recommandations Françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie) sur la conduite à tenir

<i>Manifestations allergiques</i>	<i>Conseil pour la vaccination</i>	<i>Durée de surveillance après vaccination</i>	<i>Conduite à tenir spéciale</i>
Antécédent d'allergie à un des composants du vaccin, en particulier aux polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates	Contre indiqué	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate ^{1,2} à une première injection d'un vaccin ARNm COVID 19	Contre indiqué	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate ^{1,2} à un autre vaccin ou à un médicament non identifié	Surseoir	Vacciné après avis d'expert	Adresser en allergologie
Toute autre antécédent allergique	Vaccination normale	15 à 30 minutes	

1 Bronchospasme, urticaire généralisée, anaphylaxie

2 Hors réaction locale qui autorise la vaccination avec 15 min de surveillance

Remarque les antécédents de réactions allergiques au venin d'hyménoptères (abeille, guêpe, frelon) quelle que soit leur sévérité ainsi que les antécédents d'allergie alimentaire quelle que soit leur sévérité ne sont pas une contre-indication à la vaccination

EXCIPIENTS DES VACCINS

- **Vaccins ARNm**

- Pfizer (Cominarty[®]) : PEG 2000
- Moderna (Spikevax[®]) : PEG 2000 et trometamol

- **Vaccins adénovirus**

- Astra-Zeneca (Vaxzevria[®]): PS 80
- Janssen (Johnson and Johnson[®]) : PS 80

DIFFÉRENTES SITUATIONS

TOUTES LES VACCINATIONS A VENIR SE FONT AVEC VACCINS ARNm


1- RÉACTION IMMÉDIATE APRÈS LA 1^{ère} DOSE DE VACCIN ARNm OU ADN : GRADE 1

5

- Autorisation pour poursuivre la vaccination
- Prémédication anti-H1
 - 1 cp la veille au soir
 - 1 cp 30 min avant le vaccin
 - +/- 1 cp le soir
- Pas d'indication à être vu dans le service

2- RÉACTION IMMÉDIATE À LA 1^{ère} OU 2^e DOSE VACCIN ARNm OU ADN : GRADE \geq 2

3- ATCD DE RÉACTION À MÉDICAMENT INJECTABLE INCONNU OU SUSPECT DE CONTENIR DU MACROGOL OU DU POLYSORBATE



MASTOCYTOSE

- Mastocytose **sans** ATCD d'anaphylaxie
 - En centre de vaccination sous anti-H1
- Mastocytose **avec** ATCD d'anaphylaxie
 - En HDJ sans test
 - Si bonne tolérance de la première dose, les suivantes en centre de vaccination

RÉACTION À UN VACCIN AUTRE QUE LA COVID-19

- Autorisation à la vaccination sous anti-H1
- Possible en ambulatoire si grade 1 (centre vaccination ou en ville)
- Si grade 2 ou plus : HDJ dans le service +/- test macrogol

RÉACTION SÉVÈRE NON IMMÉDIATE

- Discussion du dossier en RCP

MERCI

www.chu-lyon.fr



HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON