

Module 3 – Allergologie Pédiatrique

ITO – IMMUNOTHÉRAPIE ORALE

OBJECTIF

MISE EN ŒUVRE

DÉROULEMENT

Karine CORREARD

PH – Service de Pneumologie et d'Allergologie pédiatrique

HFME - Bron

anne-karine.correard@chu-lyon.fr



PLAN

- OBJECTIF
- MISE EN OEUVRE
- DEROULEMENT




PLAN

➔ OBJECTIF

- MISE EN OEUVRE

- DEROULEMENT



L'IMMUNOTHÉRAPIE ORALE - DÉFINITIONS

Allergie
alimentaire

Définition : Administration orale de faibles doses d'allergène d'augmentation progressive jusqu'à une dose de maintenance prédéfinie

Afin d'augmenter le seuil de réaction pendant le traitement (*désensibilisation*)

Voire arriver à une efficacité après l'arrêt (*SU/tolérance/rémission*)

• Quel est notre objectif vis-à-vis du patient ?

Améliorer la qualité de vie

Désensibilisation partielle, complète, SU, rémission, tolérance

Protéger des accidents graves
Moins de réactions
Moins de symptômes

Manger à la cantine, au restaurant?
Arrêter la trousse d'urgence et le pai ?
Moins d'anxiété des réactions

→ A qui proposer : âge, profil, facteurs de réussite ?
→ Quels protocoles ?

DEFINITIONS



- **Desensitization / Désensibilisation**
 - =Augmentation de la **dose-seuil réactive (DR)** chez un patient qui consomme régulièrement l'aliment
 - Augmentation partielle de la DR (ex : tolère 300mg de protéines)
 - = Objectif atteint pour la plupart des enfants
 - Augmentation totale de la DR (ex : tolère 4,4g de protéines)
 - = objectif atteint pour une partie des enfants
- **Sustained unresponsiveness /Tolérance soutenue/Rémission :**
 - = Maintien d'une **DR élevée après arrêt de l'ITO** pendant plusieurs semaines ou mois
 - → reconsommer un aliment à distance de l'arrêt d'une ITO
 - Acquis pour un *faible nombre d'enfants*
- **Permanent tolerance cure / Guérison**
 - **Tolérance définitive, même après un arrêt prolongé de l'IT**
 - Ex allergie lait et œuf du petit enfant



FACTEURS PRONOSTIQUES



Immunité plus modifiable



Sévérité des allergies augmentée

Nourrisson

Petit enfant

Adolescent

Adulte

Meilleur taux de désensibilisation < 4ans



Plus d'événements indésirables sévères



QUEL OBJECTIF PROPOSER AUX PATIENTS?



Prévention:
Introduction
précoce des
aliments

ITO : objectif
de rémission

Arrêt ITO à
envisager

ITO : objectif de
désensibilisation
totale

Pas d'arrêt de l'ITO
possible

ITO : objectif de désensibilisation
partielle : protection des accidents

Nourrisson

Jeune enfant

Adolescent

Adulte

Fenêtre de
tolérance
4-6 mois

Fenêtre
d'opportunité
avant 36 mois

Idéalement avant
l'adolescence ?


Tout âge, avec biothérapie ?

PLAN

- OBJECTIF

- ➔ MISE EN OEUVRE

- DEROULEMENT





PRISE DE DECISION

Oral immunotherapy for peanut allergy: The pro argument

R. Sharon Chinthrajah^{a,b,c*}, Shu Cao^{a,b}, Theresa Dunham^d, Vanitha Sampath^{a,b}, Sharad Chandra^a, Meng Chen^{a,b}, Sayantani Sindher^{a,b,c} and Kari Nadeau^{a,b,c}




Fig. 1 Legend: Key components of shared-decision making to empower patients and their families to make an informed choice regarding OIT.



A QUI PROPOSER UNE ITO ? FACTEURS PRONOSTIQUES ?

POSITION PAPER | [Free Access](#)

EAACI Guidelines on allergen immunotherapy: IgE-mediated food allergy

G. B. Pajno, M. Fernandez-Rivas, S. Arasi, G. Roberts, C. A. Akdis, M. Alvaro-Lozano, K. Beyer, C. Bindslev-Jensen, W. Burks, M. Ebisawa, P. Eigenmann, E. Knol ... [See all authors](#) ▾

First published: 27 September 2017 | <https://doi.org/10.1111/all.13319> | Citations: 276

G. B. Pajno and M. Fernandez-Rivas contributed equally

Allergy, Asthma & Clinical Immunology

[Home](#) [About](#) [Articles](#) [Submission Guidelines](#)

Review | [Open Access](#) | Published: 18 March 2020

CSACI guidelines for the ethical, evidence-based and patient-oriented clinical practice of oral immunotherapy in IgE-mediated food allergy

[P. Bégin](#), [E. S. Chan](#), [H. Kim](#), [M. Wagner](#), [M. S. Cellier](#), [C. Favron-Godbout](#), [E. M. Abrams](#), [M. Ben-Shoshan](#), [S. B. Cameron](#), [S. Carr](#), [D. Fischer](#), [A. Haynes](#), [S. Kapur](#), [M. N. Primeau](#), [J. Upton](#), [T. K. Vander Leek](#) & [M. M. Goetghebeur](#)

REVIEW ARTICLE | VOLUME 15, ISSUE 9, 100687, SEPTEMBER 01, 2022

Managing food allergy: GA²LEN guideline 2022

[Antonella Muraro, MD](#), [Debra de Silva, PhD](#), [Susanne Halken, DM DMSc](#) ...
[Torsten Zuberbier, MD](#), [Graham Roberts, DM](#) ... on behalf of GA²LEN Food Allergy Guideline Group •
[Show all authors](#) • [Show footnotes](#)

[Open Access](#) • Published: September 07, 2022 • DOI: <https://doi.org/10.1016/j.waojou.2022.100687>

	Pour qui ?	Pour quel aliment ?
EAACI 2018 (Pajno)	Enfant >4-5 ans (mais pas SU)	Lait/oeuf/ cacahuète
CSACI 2020 (Begin)	Tous les enfants Eventuellement les adultes	Tous
GA ² LEN 2022 (Muraro)	Enfant ≥4 ans	Lait/oeuf/ cacahuète

Et les plus jeunes ???

INDICATIONS – CONTRE-INDICATIONS (RECO EAACI 2017)

- « *L'ITO pourrait être réalisé dans les centres de recherche et les cliniques spécialisées* »
- Indications :
 - Allergie IgE médiée prouvée par histoire clinique + tests cutanés/biologiques ou TPO
 - Éviction inefficace, non désirée ou causant une altération importante de la qualité de vie

Allergy EUROPEAN JOURNAL OF ALLERGY
AND CLINICAL IMMUNOLOGY



POSITION PAPER |  [Free Access](#)

EAACI Guidelines on allergen immunotherapy: IgE-mediated food allergy

G. B. Pajno, M. Fernandez-Rivas, S. Arasi, G. Roberts, C. A. Akdis, M. Alvaro-Lozano, K. Beyer, C. Bindslev-Jensen, W. Burks, M. Ebisawa, P. Eigenmann, E. Knol ... [See all authors](#) ▾

First published: 27 September 2017 | <https://doi.org/10.1111/all.13319> | Citations: 249



INDICATIONS – CONTRE-INDICATIONS (RECO EAACI)

- **CONTRE-INDICATIONS absolues**
 - faible observance au traitement (patient et famille),
 - asthme non contrôlé ou sévère,
 - néoplasie active,
 - pathologie auto-immune active,
 - œsophagite à éosinophiles active,
 - début du traitement pendant la grossesse.
- **CONTRE-INDICATIONS relatives**
 - pathologies sévères systémiques,
 - pathologies auto-immunes en régression,
 - dermatite atopique active non contrôlée,
 - urticaire chronique,
 - prise de bêtabloquants et IEC,
 - mastocytose

Allergy EUROPEAN JOURNAL OF ALLERGY
AND CLINICAL IMMUNOLOGY



POSITION PAPER | [Free Access](#)

EAACI Guidelines on allergen immunotherapy: IgE-mediated food allergy


G. B. Pajno, M. Fernandez-Rivas, S. Arasi, G. Roberts, C. A. Akdis, M. Alvaro-Lozano, K. Beyer, C. Bindslev-Jensen, W. Burks, M. Ebisawa, P. Eigenmann, E. Knol ... [See all authors](#) ▾

First published: 27 September 2017 | <https://doi.org/10.1111/all.13319> | Citations: 249



INDICATIONS – CONTRE-INDICATIONS (CSACI 2020)

Allergy, Asthma &
Clinical Immunology



[Allergy Asthma Clin Immunol](#). 2020; 16: 20.

PMCID: PMC7079444

Published online 2020 Mar 18. doi: [10.1186/s13223-020-0413-7](https://doi.org/10.1186/s13223-020-0413-7)

PMID: [32206067](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32206067/)

Un antécédent d'anaphylaxie et la présence d'AA multiples ne représentent pas une contre-indication à l'ITO !

Indiqué chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent

A considérer chez l'adulte (balance bénéfique/risque)

CSACI guidelines for the ethical, evidence-based and patient-oriented clinical practice of oral immunotherapy in IgE-mediated food allergy

[P. Bégin](#),^{1,2,3} [E. S. Chan](#),⁴ [H. Kim](#),^{5,6} [M. Wagner](#),⁷ [M. S. Cellier](#),³ [C. Favron-Godbout](#),⁸ [E. M. Abrams](#),⁹ [M. Ben-Shoshan](#),¹⁰ [S. B. Cameron](#),^{4,11} [S. Carr](#),¹² [D. Fischer](#),⁵ [A. Haynes](#),¹³ [S. Kapur](#),¹⁴ [M. N. Primeau](#),¹⁵ [J. Upton](#),¹⁶ [T. K. Vander Leek](#),¹² and [M. M. Goetghebeur](#)⁷




EST-CE EFFICACE ? META-ANALYSE

- 2017
- 25 ITO, 1 EPIT, 5 SLIT
- 16 lait, 11 œuf, 7 cacahuète, 1 noisette, 2 pêche, 3 pommes, 3 poissons
- Meta-analyse possible sur 27 essais avec un total de 1171 subjects
- Desensibilisation bénéfique avec relative risk (RR) = 0.16, 95% CI 0.10, 0.26;

REVIEW ARTICLE

Allergen immunotherapy for IgE-mediated food allergy: a systematic review and meta-analysis

U. Nurmatov¹, S. Dhimi², S. Arasi^{3,4}, G. B. Pajno³, M. Fernandez-Rivas⁵, A. Muraro⁶, G. Roberts^{7,8}, C. Akdis⁹, M. Alvaro-Lozano¹⁰, K. Beyer^{11,12}, C. Bindslev-Jensen¹³, W. Burks¹⁴, G. du Toit¹⁵, M. Ebisawa¹⁶, P. Eigenmann¹⁷, E. Knol¹⁸, M. Makela¹⁹, K. C. Nadeau²⁰, L. O'Mahony²¹, N. Papadopoulos²², L. K. Poulsen²³, C. Sackesen²⁴, H. Sampson²⁵, A. F. Santos²⁶, R. van Ree²⁷, F. Timmermans²⁸ & A. Sheikh²⁹



ITO: EFFETS SECONDAIRES

- Fréquence élevée des **réactions allergiques lors d'une ITO (80 %)**

- +++ **phase d'augmentation des doses**
- Mais aussi phase de maintenance: **!! cofacteurs**
- Signes digestifs (douleurs abdo) et cutanéomuqueux

- ...+ fréquentes que si éviction alimentaire...

- **Réactions anaphylactiques =25 %** des patients

- 15 % d'entre eux utilisent l'adrénaline pour traiter une réaction allergique

CHU DK, WOOD RA, et al. Oral immunotherapy for peanut allergy (PACE): a systematic review and meta-analysis of efficacy and safety. Lancet, 2019

- **Dégoût et lassitude → arrêts fréquents**

- **OE en lien avec l'ITO = 0,5-5 %** des cas: suivi sur le long terme

PETRONI D Eosinophilic esophagitis and symptoms possibly related to eosinophilic esophagitis in oral immunotherapy. Ann Allergy Asthma Immunol, 2018

- En cas d'échec d'augmentation des doses (**ES ++: réactions anaphylactiques avec des seuils réactogènes bas**)

- → **Traitements additionnels (omalizumab) à envisager, au cas par cas, dans les centres experts**



ALTERNATIVE : EVICTION

○ Alternative historique : le tout éviction !

- Mesures de **prévention**: éviction alimentaire rigoureuse / lecture étiquetage obligatoire des allergènes
- Traitement des réactions allergiques accidentelles / port trousse d'urgence avec stylo auto injectable
- Malgré cette prise en charge: **risque de réactions allergiques accidentelles, parfois sévères (létales)**
- **Aggravation d'une partie des allergies avec réactions aux très petites quantités**
- **Peu de guérison spontanées (15% pour allergie arachide <5 ans)**
- => **altération de la qualité de vie** (phobie alimentaire, anxiété...).




PLAN

- OBJECTIF


- MISE EN OEUVRE

- ➔ DEROULEMENT



LES DIFFÉRENTES ITO

- ITO lait et œuf du nourrisson
 - appliquer le principe sans calcul des doses
- ITO fruit PR10 et LTP
 - selon sévérité des réactions
- ITO allergies sévères
 - protocole bien défini



ITO LAIT ET ŒUF DU NOURRISSON : FORMES CUITES ?

- Études : tolérance meilleure avec les formes cuites mais moindre efficacité !
- LAIT TPO 25ml à 12 mois après 2 semaines d'arrêt : 3/16 contre 5/12
- ŒUF TPO à 2 ans : 4/28 contre 18/24 groupe ITO
- ŒUF SU à 2 ans 3/28 groupe œuf cuit contre 10/24 groupe ITO

Received: 13 April 2020 | Revised: 25 July 2020 | Accepted: 14 August 2020

DOI: 10.1111/pai.13352

ORIGINAL ARTICLE

WILEY

A randomized trial of oral immunotherapy for pediatric cow's milk-induced anaphylaxis: Heated vs unheated milk

Ken-ichi Nagakura^{1,2}  | Sakura Sato^{3,4}  | Yoko Miura¹  | Makoto Nishino^{1,4}  | Kyohei Takahashi^{1,4}  | Tomoyuki Asaumi¹  | Kiyotake Ogura^{1,4} | Motohiro Ebisawa^{2,3}  | Noriyuki Yanagida¹ 

Food allergy and gastrointestinal disease

Induction of sustained unresponsiveness after egg oral immunotherapy compared to baked egg therapy in children with egg allergy

 Check for updates

Edwin H. Kim, MD, MS,^a Tamara T. Perry, MD,^b Robert A. Wood, MD,^c Donald Y. M. Leung, MD, PhD,^d

M. Cecilia Berin, PhD,^e A. Wesley Burks, MD,^a Christine B. Cho, MD,^d Stacie M. Jones, MD,^b Amy Scurlock, MD,^b

Scott H. Sicherer, MD,^e Alice K. Henning, MS,^f Peter Dawson, PhD,^f Robert W. Lindblad, MD,^f

Marshall Plaut, MD,^g and Hugh A. Sampson, MD,^g for the Consortium for Food Allergy Research (CoFAR)

Chapel Hill,

NC; Little Rock, Ark; Baltimore, Rockville, and Bethesda, Md; and Denver, Colo



ECHELLE DU LAIT

Immunothérapie orale

(Issu et adapté de the [Map guideline](#) - IFAN.ie)

1mL de lait = 32mg de PL = 0.032g

1- Véritable petit beurre de Lu (1,31ml = 0.042g PL)

1/2 biscuit

1 biscuit (alternative Madeleine Saint Michel nature 1 puis 2)

2- Pain au lait Pasquier (3,5ml de lait = 0,11gPL)

1/4 pain

1 pain

3- Muffin au lait ou gâteau au miel (25mL = 0.8gPL)

1/2 muffin

1 muffin

4- Crêpes (4,32ml de lait = 0,14g PL mais moins cuit)

1/2 crêpe Ex : crêpe fourrée de [Wahou](#) ou crêpe maison

1 crêpe

5- Quiche lorraine Marie ou Tarte aux poireaux gratinée à l'emmental Marie (3g PL)

50g (ou fait maison avec 50ml de crème et 40g d'emmental = 4 parts)

100g

6- Lasagne (4,3g PL)

100g

200g

Food Allergy Fun



www.foodallergyfun.com

TGF 2012

7- Pizza

(Ex mini pizza jambon fromage de [Buitoni](#) ou pizza maison avec 15g de fromage dessus soit 4g de PL)

1/2 mini pizza ou 35g

1 mini pizza ou 70g

8 Chocolat au lait

2 carrés

6 carrés

9- Yaourt (140ml de lait)

125ml

10- Fromage (200 à 300ml de lait ; de moins en moins chauffé)

20g de gruyère/comté/emmental puis 30g de camembert puis 1 carré frais de Gervais

11- Lait stérilisé UHT ou formule infantile en tétra pack - 100ml- puis 200ml

12- Lait pasteurisé ou formule infantile en poudre - 100ml –puis 200ml



ITO LAIT PETIT ENFANT

ECHELLE DU LAIT

Immunothérapie orale

1ml de lait = 32mg de PL = 0.032g

Commencer au moment de la diversification entre 4 et 6 mois

1- Véritable petit beurre de Lu (1,31ml = 0.042g PL) à mélanger dans une compote

1/2 biscuit

1 biscuit (alternative Madeleine Saint Michel nature 1 puis 2)

2- Savane au yaourt de Brossard 27g (0.17gPL) ou **gâteau au yaourt maison 22g** (0.16gPL)

Savane au yaourt de Brossard

ou gâteau au yaourt maison

1/2

1/64^e de part (11g)

1

1/32^e de part (22g)

3- Crêpes (4,32ml de lait = 0,14g PL mais moins cuit)

Ex : crêpe fourrée de **Whaou** ou crêpe maison (mais pas fourrée chocolat)

Ou 15ml de crêpe maison

1/4 crêpe maison 15ml ou 1/2 crêpe **whaou**

1/2 crêpe maison 15ml ou 1 crêpe **whaou**

1 crêpe maison 15ml

4- Quiche lorraine Marie ou Tarte aux poireaux gratinée à l'emmental Marie (3g PL)

50g

(ou fait maison avec 50ml de crème et 40g d'emmental = 4 parts)

100g

Ou **flan cuit au four laitière** (2 à 2,84g PLV)

1/2 flan

1 flan

5- Apéricube (600mg PL) – attention : bien continuer les autres aliments précédents sur d'autres repas

1/2

1

6- Petits filous fruits de Yoplais (2,65g PL)

1cac puis augmenter d'une 1cac supplémentaire chaque jour

7- Yaourt (140ml de lait soit 5g de PL)

1/2

1

8- Fromage (200 à 300ml de lait ; de moins en moins chauffé) 3-6g PL

20g de gruyère/comté/emmental (1/2 part puis 1 part)

puis 30g de camembert (1/2 part puis 1 part)

puis 1 carré frais de Gervais (1/2 part puis 1 part)

9- Lait stérilisé UHT ou formule infantile

30ml puis augmenter de 30ml chaque jour jusqu'à un biberon complet (en remplacement du lait sans protéines de lait de vache)



ECHELLE DE LAIT – E BIDAT





Figure. Échelle d'introduction des protéines de lait de vache.

Food Allergy Fun



www.foodallergyfun.com

TGF 2012

Attention à
l'apéricube en
cas de caséine
élevée

Ne tient pas
compte de la
cuisson

BIDAT E, DESCHILDRE A, LEMOINE A et al. Allergie aux protéines du lait de vache : guide pratique de la réintroduction des protéines du lait de vache : quand, comment réintroduire. Rev Fr Allergol, 2020

ECHELLE DE L'ŒUF

Immunothérapie orale

(Issu et adapté de the [Map guideline](#) - IFAN.ie)

BIEN CUIT

- 1- Gâteaux ou madeleines contenant de l'œuf
- 2- Boudoir
- 3- Gaufre
- 4- Pâtes sèches à l'œuf
- 5- Crêpes (1/2 puis 1)


MOYENNEMENT CUIT

- 6- Pâtes fraîches à l'œuf
- 7- Viande ou poisson pané à l'œuf
- 8- Quiche lorraine ou Tarte avec un flan (1/2 part puis 1)
- 9- Œuf cuit dur (½ puis 1)
- 10- Pain perdu
- 11- Omelette

PEU CUIT A CRU

- 12- Œuf brouillés
- 13- Crème caramel ou crème brûlé
- 14- Meringue ou crème glacé à l'œuf
- 15- Mayonnaise
- 16- Mousse au chocolat ou gâteau type bavarois (avec œuf)
- 17- Gâteau avec un glaçage
- 18- Sauce Tarare ou Hollandaise
- 19- Barre chocolatée type Milky-Way, Mars, Snickers...
- 20- Pâte à gâteau crue

Food Allergy Fun



ITO LAIT ET ŒUF DU NOURRISSON

- Démarrer **dès le diagnostic** évite de faire des examens complémentaires
- En cas d'éviction de l'allergène > 6 mois, des SPT/biologie seront nécessaires avant de commencer afin de vérifier que les SPT lait cuits sont négatifs et/ou IgE caséines ne sont pas trop élevés
- Pas de nécessité de renouveler les examens complémentaires sauf en cas de difficultés dans le déroulement du protocole
- Une bonne proportion de ces allergies guérissent spontanément et il n'y a donc pas lieu de faire des protocoles très contraignants
- 2 objectifs conjoints :
 - Obtenir la tolérance des produits cuits puis cru (la consommation de cuit améliore la tolérance du cru)
 - Augmenter progressivement la quantité d'allergène consommée
- Nombreux protocoles



ITO LAIT ET ŒUF DU NOURRISSON

CONSEILS AUX PARENTS :

- Commencer si enfant non malade (pas de fièvre) et sans poussée d'eczéma
- Commencer à l'étape 1 en cas d'éviction ou à l'étape déjà tolérée
- **environ 2 semaines** sur chaque étape (adapter selon tolérance/sévérité de l'allergie)
- Quantités à adapter selon âge et sévérité
- Une fois l'étape validé, la maintenir dans l'alimentation
- Plus on monte dans l'échelle, plus les quantités de lait augmentent et/ou moins l'allergène est cuit.
- En cas de réaction, retourner à l'étape précédente une semaine de plus. Ne pas arrêter les étapes déjà validées



ITO – FRUITS/LEGUMES PR10, PROFILINE, LTP

Immunothérapie à la pomme

- ITO à domicile pour tous les syndromes peu sévère
- Chez l'enfant, à initier au cabinet en cas de réaction de grade 2
- Chez l'adulte en HDJ si réaction de grade 2 ou plus
- Sévérité LTP > PR10/profiline
- On peut couvrir par antihistaminiques la première semaine

Débuter à la dose que l'enfant tolère

Prendre une pomme avec peau (=100g) et la mixer dans une compote (=100g)

Changer d'étape chaque semaine (à adapter selon tolérance)

Etape 1 : $\frac{1}{2}$ cac de la préparation chaque jour soit 1 g de pomme crue

Etape 2 : 1 cac (2g)

Etape 3 : 2cac (4g)

Etape 4 : 4cac (8g)

Etape 5 : 1/8eme de pomme de 100g (12,5g)

Etape 6 : $\frac{1}{4}$ (25g)

Etape 7 : $\frac{1}{2}$ (50g)

Etape 8 : $\frac{3}{4}$ (75g)

Etape 9 : 1 pomme (100g)

Puis continuer chaque jour

Food Allergy Fun



www.foodallergyfun.com TGF 2011



ITO - FRUIT PR10, PROFILINE, LTP

- **L'ITS pourrait améliorer les symptômes du syndrome pollen aliment**

Bolhaar : étude italienne de 49 patients : amélioration clinique du syndrome pollen aliment (provocation orale «ouverte» à la pomme) dans 84% des cas après ITS au pollen de bouleau

Bucher : étude hollandaise, 13 patients ont reçu une ITS pendant 1 année, 10 patients un traitement symptomatique (groupe contrôle). DBPCFC après 1 an a montré une diminution significative du syndrome pollen aliment chez 9 patients sur 13 du groupe ITS (avec disparition des symptômes chez 3). Dans le groupe contrôle, aucune diminution significative n'a été observée.

- Reco : ITS pollinique recommandée pour le syndrome pollen aliment que si le patient présente également des symptômes respiratoires lors de l'exposition aux pollens.

Bolhaar S. et al. Efficacy of birch-pollen immunotherapy on cross-reactive food allergy confirmed by skin tests and double-blind food challenges. Clin. Exp. Allergy 2004, 34:761-769.

Bucher X., Pichler W.J., Dahinden C.A. and Helbling A. Effect of tree pollen specific, subcutaneous immunotherapy on the oral allergy syndrome to apple and hazelnut. Allergy 2004, 59:1272-1276.



ITO - FRUIT PR10, PROFILINE, LTP

- L'ITO pomme aurait une certaine efficacité sur la tolérance des autres fruits du syndrome
- Gonzalez Perez : étude Espagnole, Pru p3 SLIT pour 18 patients, efficace sur la pêche et les autres fruits sauf 2 cas de persistance de réactions au kiwi

Food Allergy Fun



González Pérez et al. *Clin Transl Allergy* (2020) 10:20
<https://doi.org/10.1186/s13601-020-00325-y>

Clinical and
Translational Allergy

RESEARCH LETTER

Open Access




Pru p 3 oral immunotherapy efficacy, induced immunological changes and quality of life improvement in patients with LTP syndrome

Alejandra González Pérez, Antonio Carbonell Martínez, Ana Isabel Escudero Pastor^{*}, Cristina Navarro Garrido and Juan Carlos Miralles López



ITO – ALLERGIES SÉVÈRES

- Protéines de stockage
- Protocole bien encadré en lien avec des centres experts
- Nombreux protocoles selon les hôpitaux : aucun recommandé
- Principes toujours identiques
- Recommandé à partir de 5 ans mais peut être réalisé à partir de 18 mois
- Meilleure efficacité chez l'enfant avant l'adolescence



ITO – ALLERGIES SÉVÈRES

○ J0 : rush


- En HDJ, plusieurs petites doses (rush)
- Au cabinet ou en consultation : 1 dose, surveillance 1h

○ Phase d'escalade:

- Augmentation **progressive** des doses par voie orale **quotidienne**
- D'un aliment ***pour lequel une allergie est prouvée***
- Toutes les **1 à 4 semaines**
- Augmentation des doses à domicile ou à l'hôpital sous surveillance
- Selon une progression fixe ou déterminée de façon individuelle
- **Ajustée** selon la **tolérance** et les éventuelles réactions allergiques
 - Nécessite un recours téléphonique/mail des parents au médecin
- **Jusqu'à atteindre une dose de maintenance:**

○ Phase d'entretien = maintenance :

- Dose prédéfinie d'aliment bien tolérée quotidienne
- Pendant plusieurs années, **voire pour toute la vie**
- **= médicament, avec précautions à expliquer à l'enfant et sa famille**
- Eviction alimentaire à poursuivre en // (PAI + trousse urgence)
- Son AA n'est pas guérie



- Education à la prise d'un éventuel accident allergique++



ITO – PROTOCOLE HFME LYON – J0

- Quel aliment utiliser :
- Produit industriel : curly, cookies...
 - -> calcul de dose et couper l'aliment en petits morceaux
-
- Boissons du commerce : cajou, noisette, amande
- Crème dessert amande, pistache
 - -> Mesure avec des seringues
- Purée : arachide, noisette, cajou,
- Poudre : tous
- Gélules : pour éviter le dégoût
 - -> Mesure avec une balance de précision
- Sirop : farine+ sirop de glucose
 - -> pesée initiale avec balance de précision puis à la seringue



ITO ARACHIDE AVEC PALFORZIA

- Palforzia disponible depuis 2024 en France
- Protocole Aimmune issu des études PALISADE
- Rush initial et Montée de dose en consultation tous les 15 jours
- Maintenance à 300mg de protéines en 6 mois



PALISADE Group of Clinical Investigators, Vickery BP, et al. N Engl J Med, 2018



Maintenance dose



ITO ARACHIDE AVEC PALFORZIA

Oral immunotherapy for peanut allergy: The pro argument

R. Sharon Chinthrajah^{a,b,c,*}, Shu Cao^{a,b}, Theresa Dunham^d, Vanitha Sampath^{a,b}, Sharad Chandra^a, Meng Chen^{a,b}, Sayantani Sindher^{a,b,c} and Kari Nadeau^{a,b,c}


- Montée de dose en consultation tous les 15 jours
- Maintenance à 300mg de protéines en 6 mois



ITO – PROTOCOLE HFME – J0

- Protocole adapté des études Aimmune
- adaptations pendant le confinement lors de la pandémie
- J0 + augmentation chaque semaine à domicile
- Maintenance après 6 mois

Food Allergy Fun



PALISADE Group of Clinical Investigators, Vickery BP, et al. N Engl J Med, 2018



ITO: PROTOCOLE HFME – MONTÉE DES DOSES

Arachide

- Augmentation à domicile chaque semaine
- Éducation du patient et la famille
- Maintien de la trousse d'urgence et PAI

Planning du traitement¶

¶

Etapec	Doses-cibles¶ (en-mg-de-protéines)¶	Doses-cibles-de-noisette- (en-mg)¶	Boisson-à-la-noisette-Bjorg- à-7%¶
S1¶	0,3mg¶	2mg¶	0,3ml-de-A¶
S2¶	0,45mg¶	3mg¶	0,4ml-de-A¶
S3¶	0,6mg¶	4mg¶	0,6ml-de-A¶
S4¶	0,9mg¶	5mg¶	0,9ml-de-A¶
S5¶	1,2mg¶	8mg¶	1,2ml-de-A¶
S6¶	1,6mg¶	11mg¶	1,6ml-de-A¶
S7¶	2mg¶	13mg¶	2ml-de-A¶
S8¶	3mg¶	20mg¶	0,3ml¶
S9¶	4,5mg¶	30mg¶	0,4ml¶
S10¶	6mg¶	40mg¶	0,6ml¶
S11¶	9mg¶	50mg¶	0,9ml¶
S12¶	12mg¶	80mg¶	1,2ml¶
S13¶	16mg¶	107mg¶	1,6ml¶
S14¶	20mg¶	133mg¶	2ml¶
S15¶	30mg¶	200mg¶	3ml¶
S16¶	40mg¶	267mg¶	4ml¶
S17¶	60mg¶	400mg¶	6ml¶
S18¶	80mg¶	533mg¶	8ml¶
S19¶	100mg¶	667mg¶	10ml¶
S20¶	120mg¶	800mg¶	12ml¶
S21¶	140mg¶	933mg¶	14ml¶
S22¶	160mg¶	1067mg¶	16ml¶
S23¶	180mg¶	1200mg¶	18ml¶
S24¶	200mg¶	1330mg¶	20ml¶
S25¶	220mg¶	1467mg¶	22ml¶
S26¶	240mg¶	1600mg¶	24ml¶
S27¶	260mg¶	1733mg¶	27ml¶
S28¶	300mg¶	2000mg¶	30ml¶

Noisette

Suivi en visio à 1 et 3 mois
Disponibilité par mail et téléphone
Puis cs à 6 mois

¶	Dose-cible-en-mg-de-protéine-d'arachide¶	Dose-cible-en-mg-de-cacahuète¶	Dose-de- <u>curly</u> ¶
J0-en-HDJ¶	0,5mg--1mg-- 1,5mg--3mg--6mg¶	¶	¶
S1¶	3mg¶	12mg¶	1/16- <u>curly</u> -(1/2-dose-d'1/8- <u>curly</u> -mélangé-dans-la-compote)¶
S2¶	4,5mg¶	18mg¶	1/8- <u>curly</u> ¶
S3¶	6mg¶	24mg¶	1/8- <u>curly</u> +1/16- <u>curly</u> ¶
S4=-1-mois¶	9mg¶	36mg¶	¼- <u>curly</u> ¶
S5¶	12mg¶	48mg¶	¼- <u>curly</u> +1/8- <u>curly</u> ¶
S6¶	16mg¶	64mg¶	½- <u>curly</u> ¶
S7¶	20mg¶	80mg¶	½- <u>curly</u> +1/8- <u>curly</u> ¶
S8=-2-mois¶	30mg¶	120mg¶	¾- <u>curly</u> +¼- <u>curly</u> ¶
S9¶	40mg¶	160mg¶	1- <u>curly</u> ¶
S10¶	60mg¶	240mg¶	1,5- <u>curly</u> ¶
S11¶	80mg¶	320mg¶	2- <u>curly</u> ¶
S12=-3-mois¶	100mg¶	400mg¶	2,5- <u>curly</u> ¶
S13¶	120mg¶	480mg¶	3- <u>curly</u> ¶
S14¶	140mg¶	560mg¶	3,5- <u>curly</u> ¶
S15¶	160mg¶	640mg¶	4- <u>curly</u> ¶
S16=-4-mois¶	180mg¶	740mg¶	4,5- <u>curly</u> ¶
S17¶	200mg¶	820mg¶	5- <u>curly</u> ¶
S18¶	220mg¶	900mg¶	5,5- <u>curly</u> ¶
S19¶	240mg¶	980mg¶	6- <u>curly</u> ¶
S20=-5-mois¶	260mg¶	1060mg¶	7- <u>curly</u> ¶
S21¶	300mg¶	1200mg¶	8- <u>curly</u> ¶
S22¶	300mg¶	1200mg¶	2MMS¶

¶

ITO: PROTOCOLE HFME – MONTÉE DES DOSES

○ Précautions:

Connaître les
cofacteurs

- Le soir, au calme
- Eviter la prise à jeun
- Eviter exercice physique et émotions 1h30 après
- Éviter sport intense 1h avant et 3h après
- Peut aller dormir 1h après
- Ne pas augmenter les doses en période d'infection
- Attention en période pollinique
- Eviter AINS, alcool....

○ En cas de réaction :

- En cas de prurit, prendre une compote ou autre aliment en même temps et continuer
- Si œdème, douleur abdominale, descendre au palier précédent
- Suivi régulier avec l'équipe pour adapter le protocole

- Pris sous forme d'aliment de consommation courante
- **Prise en charge multidisciplinaire souhaitable ++ (diététicienne, psychologue)**
- **Toutes les informations sont récapitulées sur fiche d'information**
- **Adhésion enfant + parents (signature du consentement)**

!! Savoir traiter une
réaction allergique



ITO: GESTION DES EFFETS SECONDAIRES

- Prurit : Anti-H1 ponctuellement ou en préventif, pas de changement de protocole
- OEdème, urticaire : anti-h1, retour au palier précédent, +/- couverture anti-h1 sur 1-2 semaines
- Anaphylaxie : adrénaline, identifier la cause dose ou cofacteur ? Retour au palier précédent ou gestion des cofacteurs
- Douleur abdominale, reflux : penser à l'oesophagite à éosinophiles
 - Cimetidine 200mg : anti-H2, douleur épigastrique, reflux
 - Cromoglycate de sodium : 15min avant la prise, douleur abdominale
 - Ventoline ?
- Dégoût et lassitude : motiver, soutien psychologue, EMDR ?
- Échec des montées de dose : rester à une petite dose ? Ajout omalizumab ?



ITO : PROTOCOLE HFME - MAINTENANCE

- Une fois arrivé à 300mg de protéines**
- 2MMS**
- 2g de noisette ou 1 cookie granola noisette ou 30ml de boisson**
- 1,7g de noix cajou ou 42ml de boisson**

- Maintien du PAI en précisant qu'il peut consommer 50% des 300mg de protéines sans surveillance**
- Poursuivi au moins 6 mois ou plus si biologie élevée**
- Suivi par 6 mois avec SPT et IgE spécifiques, IgG4**
- TPO pleine dose à 6 mois ou plus tard si profil sévère**



ITO : PROTOCOLE HFME – TPO PLEINTE DOSE ET SUIVI ULTÉRIEUR

- Après 6 mois de maintenance et IgE < 25kU/L
- **Si réaction**, poursuite consommation quotidienne identique et suivi /6 mois
- **Si aucune réaction**, maintien du PAI quelques mois supplémentaires puis arrêt
- Poursuite consommation 300mg P 3 fois par semaine
- Cs /6 mois SPT, IgE, IgG4
- **Suivi ultérieur et IgE très faibles < 5kU/L**, on peut proposer un arrêt de consommation de 3 mois puis nouveau TPO plainte dose
- Si aucune réaction ni modification des IgE, théoriquement on pourrait arrêter la consommation régulière mais il manque des données probantes

TPO Pistache après maintenance

NOM: PRENOM: AGE:

DATE DE DEMANDE :
DATE PROGRAMMATION:

Médecin Allergologue :

Arrêt des anti-histaminiques depuis 10 jours oui non

Autorisation de soins oui non

EFR oui non

Avant la réalisation du test, faire :

- tests cutanés extrait et natifs pistache, cajou
- bilan sanguin avec IgE spécifiques pistache et noix de cajou + IgG4 pistache et cajou

Doses		TA	Pouls	DEP	Clinique	Traitement
T0	1,25g 250mg PP					
20min	2,5g 500mg PP					
1h	3,75g 750mg PP					
1h40	7,5g 1,5g PP					
2h20	7,5g 1,5gPP					
Total	23g de pistache soit 4,5g de <u>protéines</u> de pistache					



ITO ADULTE

- Moindre efficacité et effets indésirables plus nombreux
- Bien discuter la balance bénéfice-risque
- Protocole profil sévère directement plus souvent
- Indication plus large de biothérapie associée

- Les biothérapies :
 - Omalizumab si asthme sévère associé (anti-IgE)
 - Dupilumab si DA (anti-IL-4/IL-13Ralpha)



ITO EN PRATIQUE À LYON:

- Arachide: 1^{er} rush en HDJ

- Augmentation à domicile

HOPITAL FEMME MERE ENFANT Service allergologie Pr REIX et Pr

LACHAUX

Immunothérapie orale J0 : Arachide

NOM: → → → → PRENOM: → → → → DDN: → → → → AGE: ¶

DATE DE DEMANDE: ¶

DATE PROGRAMMATION: ¶

Allergie pollinique: ¶

Médecin Allergologue → :

Avant la réalisation du test, ¶

→ EFR oui non ¶

→ tests cutanés - extrait et natifs arachide + ¶

→ bilan sanguin avec IgE spécifiques arachide + recombinants + IgG4 ¶

élécs a
1 mois et
3 mois
puis cs à 6
mois

□	Doses	TA	Pouls	DEP	Clinique	Traitement
T0	2 mg 0,5 mg PP	□	□	□	□	□
T20min	4 mg 1 mg PP	□	□	□	□	□
T40min	6 mg 1,5 mg PP	□	□	□	□	□
T1h	12 mg 3 mg PP	□	□	□	□	□
T1h20	24 mg 6 mg PP	□	□	□	□	□
T1h40 Si profil non sévère IgE < 25kUI/L	48 mg 12 mg PP	□	□	□	□	□

Validé par le Docteur le Signature: ¶

¶	Dose-cible-en-mg-de-protéine-d'arachide	Dose-cible-en-mg-de-cacahuète	Dose-de-curly
J0-en-HDJ	0,5mg--1mg-- 1,5mg--3mg--6mg	¶	¶
S1	3mg	12mg	1/16-curly-(1/2-dose- d'1/8-curly-mélangé- dans-la-compote)
S2	4,5mg	18mg	1/8-curly
S3	6mg	24mg	1/8-curly+1/16-curly
S4=-1-mois	9mg	36mg	¼-curly
S5	12mg	48mg	¼-curly+1/8-curly
S6	16mg	64mg	½-curly
S7	20mg	80mg	½-curly+1/8-curly
S8=-2-mois	30mg	120mg	½-curly+¼-curly
S9	40mg	160mg	1-curly
S10	60mg	240mg	1,5-curly
S11	80mg	320mg	2-curly
S12=-3-mois	100mg	400mg	2,5-curly
S13	120mg	480mg	3-curly
S14	140mg	560mg	3,5-curly
S15	160mg	640mg	4-curly
S16=-4-mois	180mg	740mg	4,5-curly
S17	200mg	820mg	5-curly
S18	220mg	900mg	5,5-curly
S19	240mg	980mg	6-curly
S20=-5-mois	260mg	1060mg	7-curly
S21	300mg	1200mg	8-curly
S22	300mg	1200mg	2MMS



ITO EN PRATIQUE À LYON:

○ FAC:

- Noisette
- Noix de cajou
- Pistache ... etc



HOPITAL FEMME MERE ENFANT Service allergologie Pr REIX et Pr LACHAUX

Induction de tolérance JO

Poudre de noisette ou Boisson à la noisette Bjorg 7%

NOM: → → → → PRENOM: → → → → DATE DE NAISSANCE: ¶

DATE DE DEMANDE: ¶

DATE PROGRAMMATION: ¶

Allergie pollinique: ¶

Médecin Allergologue → :

Boisson Bjorg: 7% soit 1% ¶

Noisette: 15% ¶

Avant la réalisation du test, faire: ¶

--tests cutanés: extrait et natifs noisette +

--bilan sanguin avec IgE spécifiques noisette + recombinants + IgG4 ¶

--EFRouinon ¶

	Doses	TA	Pouls	DEP	Clinique	Traitement
T0	3,3mg de poudre ou 0,05ml de boisson ¶ 0,5 mg PN					
T20min	6,7mg de poudre ou 0,1ml de boisson ¶ 1mg PN					
T40min	10mg de poudre ou 0,15ml de boisson ¶ 1,5 mg PN					
T1h	20mg de poudre ou 0,3 ml de boisson ¶ 3 mg PN					
T1h20	40mg de poudre ou 0,6ml de boisson ¶ 6 mg PN					

Télé cs à 1 mois et 3 mois puis cs à 6 mois

Planning du traitement ¶

stage	Doses-cibles ¶ (en-mg-de-protéines) ¶	Doses-cibles-de-noisette- (en-mg) ¶	Boisson-à-la-noisette- Bjorg-à-6.5% ¶	Kellogg- trésor- 0.5%-(5mg) ¶	Kellogg- trésor- 1%-(10mg) ¶	Tartiné- Belyta- (80mg) ¶	Résille-or-de-lu- (212mg) ¶	Croissant-de-lune-de-Bablsen- (840mg) ¶	Kinder- Bunsen- white-lu ¶ 975mg ¶	Cookies- chocolat- noisette- Granolax
S1	3mg	20mg	0,3ml	4	2					
S2	4,5mg	30mg	0,4ml	6	3					
S3	6mg	40mg	0,6ml	8	4					
S4	9mg	50mg	0,9ml	10	5					
S5	12mg	80mg	1,2ml	16	8	1				
S6	16mg	107mg	1,6ml	20	10	1+1/4- (100mg) ¶				
S7	20mg	133mg	2ml	26	13	1+3/4 ¶ (140mg) ¶				
S8	30mg	200mg	3ml	40	20	2+1/2- (200mg) ¶	1-(212mg) ¶	¼ ¶ (210mg) ¶		
S9	40mg	267mg	4ml				1+1/3 ¶ (283mg) ¶	1/3 ¶		
S10	60mg	400mg	6ml				2 ¶ (424mg) ¶	1/2 ¶		
S11	80mg	533mg	8ml				2+1/2 ¶ (530mg) ¶	2/3-(ou-¼- +1/2-résille-or) ¶		
S12	100mg	667mg	10ml				3- ¶ (636mg) ¶	4/5-(ou-¼- +1-résille-or) ¶		
S13	120mg	800mg	12ml					1 ¶ (840mg) ¶		
S14	140mg	933mg	14ml					1+1/6 ¶	<1 ¶ (975mg) ¶	
S15	160mg	1067mg	16ml					1+1/4 ¶	¼+1- croissant- (1083mg) ¶	
S16	180mg	1200mg	18ml					1+1/2 ¶	1+1/4- croissant ¶ (1218mg) ¶	
S17	200mg	1330mg	20ml					1+2/3 ¶	½+1- croissant- (1327mg) ¶	
S18	220mg	1467mg	22ml					1+3/4 ¶	1+1/2- croissant ¶ (1463mg) ¶	
S19	240mg	1600mg	24ml					2 ¶	¾+1- croissant ¶ (1571mg) ¶	
S20	260mg	1733mg	27ml					2+1/4 ¶	1+3/4- croissant ¶	
S21	300mg	2000mg	30ml					2+1/2 ¶		1-(2070g) ¶

Validé par le Docteurle: Signature: ¶

ITO EN PRATIQUE À LYON:

○ FAC:

- Noisette
- Noix de cajou
- Pistache



Induction de tolérance Boisson à la noisette Bjorg 7% protocole profil sévère

NOM → → → → → PRENOM → → → → → DATE DE NAISSANCE

DATE DE DEMANDE

DATE PROGRAMMATION

Allergie pollinique

Médecin: Allergologue → :

Boisson Bjorg 7% soit 1%

Noisette 15%

Avant la réalisation du test, faire:

- tests cutanés: extrait et natifs noisette +
- bilan sanguin avec IgE spécifiques noisette + recombinants + IgG4
- EFR:oui.....non

	Doses	TA	Pouls	DEP	Clinique	Traitement
T0	0,5ml de boisson 10-2 0,05 mg PN					
T20min	1ml de boisson 10-2 0,1mg PN					
T40min	1,5ml de boisson 10-2 0,15 mg PN					
T1h	3 ml de boisson 10-2 0,3 mg PN					
T1h20	6ml de boisson 10-2 0,6 mg PN					

Validé par le Docteur le Signature

L'enfant repart avec le protocole «2 ITO Noisette profil sévère programme des 6 premiers mois»

Profil très sévère

1 élé cs à 1 mois et 3 mois puis cs à 6 mois

Planning du traitement

Etape	Doses cibles (en mg de protéines)	Doses cibles de noisette (en mg)	Boisson à la noisette Bjorg à 7%
S1	0,3mg	2mg	0,3ml de A
S2	0,45mg	3mg	0,4ml de A
S3	0,6mg	4mg	0,6ml de A
S4	0,9mg	5mg	0,9ml de A
S5	1,2mg	8mg	1,2ml de A
S6	1,6mg	11mg	1,6ml de A
S7	2mg	13mg	2ml de A
S8	3mg	20mg	0,3ml
S9	4,5mg	30mg	0,4ml
S10	6mg	40mg	0,6ml
S11	9mg	50mg	0,9ml
S12	12mg	80mg	1,2ml
S13	16mg	107mg	1,6ml
S14	20mg	133mg	2ml
S15	30mg	200mg	3ml
S16	40mg	267mg	4ml
S17	60mg	400mg	6ml
S18	80mg	533mg	8ml
S19	100mg	667mg	10ml
S20	120mg	800mg	12ml
S21	140mg	933mg	14ml
S22	160mg	1067mg	16ml
S23	180mg	1200mg	18ml
S24	200mg	1330mg	20ml
S25	220mg	1467mg	22ml
S26	240mg	1600mg	24ml
S27	260mg	1733mg	27ml
S28	300mg	2000mg	30ml



ITO EN PRATIQUE A LYON: ADAPTATION DU PROTOCOLE AIMMUNE

Préparation des doses diluées A : Mélanger 1ml de boisson de noix de cajou avec 9ml d'eau

Planning-du-traitement¶

Etape¶	¶	Doses-en-mg-de-protéines-de-noix-de-cajou¶	Dose-de-Boisson-à-la-noix-de-cajou-Bjorg-à-4%¶	Dose-de-Boisson-à-la-noix-de-cajou-Auchan-à-3%¶	¶
1¶	J0¶	0,5mg--1mg--1,5mg--3mg--6mg¶	0,07ml--0,14ml--0,2ml--0,4ml--0,8ml¶	0.08·ml--0.16·ml--0.25·ml--0.5·ml--1·ml¶	¶
¶	S1¶	3mg¶	0,4ml¶	0.5·ml¶	¶
¶	S2¶	4,5mg¶	0,6ml¶	0.7·ml¶	¶
2¶	S3¶	6mg¶	0,8ml¶	1ml¶	¶
¶	S4¶	9mg¶	1,2ml¶	1.3·ml¶	¶
3¶	S5¶	12mg¶	1,6ml¶	2.2·ml¶	¶
¶	S6¶	16mg¶	2,2ml¶	2.5·ml¶	¶
4¶	S7¶	20mg¶	2,8ml¶	3.2·¶	¶
¶	S8¶	30mg¶	4ml¶	4.6·ml¶	¶
5¶	S9¶	40mg¶	5,5ml¶	6ml¶	¶
¶	S10¶	60mg¶	8ml¶	9ml¶	¶
6¶	S11¶	80mg¶	11ml¶	12ml¶	¶
¶	S12¶	100mg¶	14ml¶	16ml¶	¶
7¶	S13¶	120mg¶	17ml¶	19ml¶	¶
¶	S14¶	140mg¶	20ml¶	23ml¶	¶
8¶	S15¶	160mg¶	22ml¶	25ml¶	¶
¶	S16¶	180mg¶	25ml¶	28ml¶	¶
9¶	S17¶	200mg¶	28ml¶	32ml¶	¶
¶	S18¶	220mg¶	32ml¶	36ml¶	¶
10¶	S19¶	240mg¶	35ml¶	40ml¶	¶
¶	S20¶	270mg¶	39ml¶	44ml¶	¶
11¶	S21¶	300mg¶	42ml¶	48ml¶	¶
12¶	6-mois-de-phase-de-maintenance¶	300mg¶	42ml¶	48ml¶	¶



Profil très sévère: NC diluée

Planning-du-traitement¶

Etape¶	Doses-en-mg-de-protéines-de-noix-de-cajou¶	Dose-de-Boisson-à-la-noix-de-cajou-Bjorg-à-4%¶	¶
J0¶	0,05mg--0,1mg--0,15mg--0,3mg--0,6mg¶	Dilué-à-10-2¶ 0,7ml--1,4ml--2ml--4ml--8ml¶	¶
S1¶	0,3mg¶	0,4ml-de-A¶	¶
S2¶	0,45mg¶	0,6ml-de-A¶	¶
S3¶	0,6mg¶	0,8ml-de-A¶	¶
S4¶	0,9mg¶	1,2ml-de-A¶	¶
S5¶	1,2mg¶	1,6ml-de-A¶	¶
S6¶	1,6mg¶	2,2ml-de-A¶	¶
S7¶	2mg¶	2,8ml-de-A¶	¶
S8¶	3mg¶	0,4ml¶	¶
S9¶	4,5mg¶	0,6ml¶	¶
S10¶	6mg¶	0,8ml¶	¶
S11¶	9mg¶	1,2ml¶	¶
S12¶	12mg¶	1,6ml¶	¶
S13¶	16mg¶	2,2ml¶	¶
S14¶	20mg¶	2,8ml¶	¶
S15¶	30mg¶	4ml¶	¶
S16¶	40mg¶	5,5ml¶	¶
S17¶	60mg¶	8ml¶	¶
S18¶	80mg¶	11ml¶	¶
S19¶	100mg¶	14ml¶	¶
S20¶	120mg¶	17ml¶	¶
S21¶	140mg¶	20ml¶	¶
S22¶	160mg¶	22ml¶	¶
S23¶	180mg¶	25ml¶	¶
S24¶	200mg¶	28ml¶	¶
S25¶	220mg¶	32ml¶	¶
S26¶	240mg¶	35ml¶	¶
S20¶	270mg¶	39ml¶	¶
S21¶	300mg¶	42ml¶	¶

CAS CLINIQUES

○ Justine né le 19/08/2013: allergie arachide

○ Antécédents personnels :

- Asthme du nourrisson
- Allergie arachide

○ Histoire de la maladie :


- Accidents de grade 4 en 2012 avec bronchospasme
- Accidents après contact ou inhalation 2017 : dysphonie

○ Bilan Novembre 2018 :

- SPT : cacahuète 8mm,
- Biologie = IgEs arachide >100kU/L , arah1,2,6>100kU/L, ara h3 10,40KU/L; ara h8 et 9<0kU/L



- → sept 2019 : Initiation d'une ITO arachide selon protocole AIMMUNE adapté
- Tests cutanés:
 - témoin positif 3 mm,
 - arachide (extrait) 5 mm, arachide (natif) 13 mm
- IgE spécifiques :
 - Arachide >100 kU/L, rAra h1,2,6 >100, rAra h3 12kU/L, rAra h6 82,5kU/L, rAra h8 et 9<0,10
 - IGG4 0,55 mg/l
- TPO J0: **DCT 48mg de cacahuètes soit 12mg de protéines d'arachide**
- Suivi:
 - **Aucun effet indésirable pendant la montée des doses**
 - **6 mois: Dose de maintenance: 2MMS**
 - Biologie : IgEs Arachide : 1509kU/L, IgG4 1,19 mg/l
 - **12 mois : IgEs Arachide : 436kU/L, IgG4 2,19 mg/l**
 - **18 mois : IgEs arachide : 428kU/L, IgG4 3,46 mg/l**
 - **24 mois : IgEs Arachide : 173kU/L, IgG4 7,73 mg/l ; TPO tolérance de 1g de protéines d'arachide (>6 cacahuètes)**



CAS CLINIQUES

○ Rita née le 13/01/2015 : allergie noisette, cajou/pistache, noix

○ Antécédents personnels :

- RCA chat
- Asthme viro-induit guéri
- Allergie multiple fruits à coque

○ Histoire de la maladie :

- Accidents de grade 2 en 2016 après la consommation de chocolat aux noisettes ; de noix
- Accident de grade 2 en 2019 après ¼ de noix de cajou : vomissements, prurit pharyngé
- accident de grade 1 en 2020 après saucisson à la pistache : prurit buccal
- consommation des amandes

○ Bilan 01/2020 :

- SPT : T+4mm, noix de cajou 7mm (natif 9mm), pistache 4mm, noisette 5mm (natif 5mm), arachide/autre FAC 0mm
- Biologie = IgEs cajou 21,7kU/L, Ana o3 18,70kU/L, pistache 23,40kU/L
- IgE spécifique noix 54,5kU/L, noisette 25,10kU/L, cor a1 et cor a8 <0,10kU/L, cor a14 : 41,30kU/L, cor a9 : 5,17kU/L



• → décembre 2020 : ITO noisette

- Tolérance : prurit buccal au début
- Maintenance à partir de fin juin
- TPO pleine dose novembre 2021 :
 - SPT6mm, IgE 10,10kU/L, IgG4 7,32mg/L
 - Réaction DCT 6,5g soit 940mg de protéines de noisette

• → mars 2021 : ITO cajou

- Douleur abdominale à la dose 1,2ml et à la dose 5,5ml : baisse de dose x1 semaine puis poursuit du protocole
- Maintenance à partir de septembre
- Persistance de douleur abdominale en cas d'asthénie, régressant spontanément

• → mai 2021 : ITO noix

- Bien toléré
- Protocole réalisé plus lentement du fait des 3 ITO, actuellement environ 1200mg de noix

CONCLUSION


- ITO selon le protocole AIMMUNE adapté =
 - Efficace, rapide (<1 an pour atteindre dose de maintenance)
 - - de lassitude
 - - de perdu de vue avec suivi télécs régulier
 - Dose de maintenance atteinte + rapidement qu'avec le protocole TPO/6 mois
 - Bien tolérée
 - Pour l'arachide
 - Mais aussi FAC et légumineuses...
- **1^{ere} dose par rush en HDJ ou 1 dose en consultation selon âge et sévérité**
- **Poursuite augmentation chaque semaine à domicile**
- Adaptation en fonction des ES au cas par cas
- Objectif: atteindre la dose de maintenance à 300mg de protéines
- Début avant 5 ans si possible car meilleur tolérance
- ITO à plusieurs aliments de manière conjointe pour élargir le régime avant l'adolescence
- Nécessité de **pouvoir caractériser au mieux les « bons répondeurs » et les « + à risque »**
 - Quels patients à l'hôpital?
 - Quels patients à domicile?

- Nécessité d'études prospectives
- Harmonisation des pratiques en France = 1 des objectifs du GTAAA



Florence

Marie



Camille

Priscille

Karine

L'équipe des allergologues de l'HFME vous remercie pour votre attention et vous accueille en stage quand vous voulez ! ;-)

